

## Onkruidbestrijding in wintergranen

Wanneer de wintergranen de eerste N-gift hebben gekregen en de meeste onkruiden gekiemd en aan de groei zijn, is het tijd voor de onkruidbestrijding. Vooral op de vroeg gezaaide percelen waar dit najaar geen onkruidbestrijding heeft plaats gevonden en op gespitte percelen vinden we al behoorlijk ontwikkeld onkruid.

Een combinatie die sterk is op grassen en op jonge zaadonkruiden in wintertarwe:

- **0,18 - 0,2\* kg Cossack Star + 1 l Robbester** (*flink ontwikkelde planten van kleeftkruid, klein kruiskruid en klimopbladereprijs worden minder goed bestreden*) \* Let op verschil in driftreductie, zie voor meer informatie pagina 54 van de Wegwijzer 2020.

Wanneer in wintertarwe al flink ontwikkelde onkruiden, inclusief grassen, aanwezig zijn:

- **0,2 kg Atlantis Star + 200 - 225 gram Capri Twin + 1 l Robbester** (*bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel en duivekervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toevoegen*).

Wanneer in wintertarwe de duistplanten nog jong zijn en er geen straatgras bestreden hoeft te worden:

- **225 - 275 gram Capri Twin + 1 l Robbester** (*bij grotere paarse dovenetel en duivekervel 0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toevoegen*).

In wintergerst en wintertarwe waar geen grassen bestreden hoeven te worden of waar gras onder gezaaid is:

- **1 l Tapir + 1 - 1,5 l MCPA** (*bij aanwezigheid van akkerviooltje, grotere paarse dovenetel en ereprijssoorten 1 - 1,5 l Fox 480 SC of 70 gram Biathlon 4D + 1 l Robbester* (*niet op akkerviooltje toevoegen*)).

### Enkele aandachtspunten:

- Voor een goede werking van de grassenmiddelen is een RV van minimaal 60% gewenst. Deze RV wordt midden op de dag bij een oosten- of noordenwind zelden gehaald!
- Atlantis Star, Cossack Star en Capri Twin kunnen niet in gerst gespoten worden!
- Bij onderzaai van rietzwenk en in wintergerst kunnen duist, windhalm en wilde haver bestreden worden met **1 - 1,2 l Puma Extra + 1 l Robbester**.
- Voer de onkruidbestrijding in ieder geval uit vóór het sleepslangen met drijfmest!

## Groeiregulatie en T0 ziektebestrijding in wintertarwe

Wanneer de wintertarwe goed aan de groei is dient in het stadium einde uitstoeling - eerste knoop voelbaar, de eerste groeiregulatie plaats te vinden. In wintertarwe adviseren wij voor de eerste keer **0,5 l CeCeCe + 0,35- 0,4 kg Produx**. Houdt van Produx de laagst vermelde dosering aan wanneer gecombineerd gespoten wordt met de onkruidbestrijding. Veiliger is nog om bij een gecombineerde bespuiting te kiezen voor **1 l CeCeCe** of om de onkruidbestrijding en de groeiregulatie apart uit te voeren.

Zeker in de vroeg gezaaide tarwe komt regelmatig septoria voor. Gele roest wordt nog maar incidenteel gevonden maar kan de komende weken met het stijgen van de temperatuur zeker toenemen.

Wanneer op het moment van de eerste groeiregulatie gele roest gevonden wordt in het gewas, adviseren wij aan deze bespuiting **1,5 l Osiris** toe te voegen. Septoria zal vooral uitbreiden bij regenachtig weer. Is er veel septoria in het gewas aanwezig en wordt er langere tijd wisselvallig weer voorspeld, wat zorgt voor verspreiding hiervan, voer dan ook een bespuiting uit. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van **1,5 l Osiris, 2 l Daconil 500 vlb, 1,5 l Alternil** of **2 kg Mancozeb**.

## Voorkom muizen- en slakkenschade in bieten

Zowel de kans op schade door slakken als bosmuizen wordt groter bij een grofkluitig zaaibed. De kans hierop is dit jaar reëel aanwezig. Schade door muizen is er vooral bij een vroege zaai en trage kieming. Muizenschade kan zoveel mogelijk voorkomen worden door voldoende diep te zaaien en door een aantal dagen voor het zaaien alternatief voer langs de perceelranden aan te bieden.

Controleer de bieten vanaf de opkomst ook op slakkenvraat. Vooral op percelen waar een groenbemester is geteeld en de grond erg grof is gevallen, is de kans op schade door slakken groot. Strooi op percelen waar schade wordt waargenomen of wordt verwacht tijdig **7 kg Derrex slakkenkorrels**.