

## Kiemremming van aardappelen start met MH

Met de wegval van Chloorprofam als kiemremmer wordt de toepassing van Royal MH in consumptieaardappelen een standaardadvies voor de kiemremming. Door een op het juiste tijdstip en op de juiste manier uitgevoerde behandeling met MH op het veld, blijven de aardappelen in de bewaring langer in rust. Afhankelijk van het ras, de bewaarduur en de bewaarmethode kan er na een toepassing met MH ook vaak op de kosten voor de nieuwe generatie kiemremmingmiddelen, zoals 1,4Sight, Biox-M en Argos bespaard worden.

Naast kiemremming heeft een toepassing met MH nog andere voordelen:

- Het aantal opslagplanten in de volgteelt wordt sterk beperkt, afhankelijk van het ras tot wel 75%.
- Bij een tijdige toepassing kan de secundaire groei door doorwas stopgezet of beperkt worden. Royal MH stopt de celdeling, doorwasknolletjes kleiner dan Ø 10 mm zullen bij een goede opname daarom niet verder groeien.

Nadeel van een toepassing met MH is dat kort na de toepassing er geen nieuwe loofvorming meer plaats zal vinden.

### Advies:

Gebruik een dosering van **5 kg Royal MH** minimaal 3-, maar bij voorkeur 4 - 5 weken voor de verwachte loofdoding.

Om opbrengstderving te voorkomen niet eerder spuiten voordat 80% van de knollen een diameter heeft > 30-35 mm en pas als het bladapparaat over de top van de groei heen is (einde van de bloei). Let op bij percelen met een onregelmatige opkomst!

Aandachtspunten bij de toepassing van Royal MH:

- Spuit op een vitaal en mals gewas dat niet in stress verkeerd.
- Het ras Innovator vertoont vaak onverwacht snel een sterke slijtage na een periode van hitte. Wees hierop alert en voer direct een bespuiting uit als de eerste slijtageverschijnselen zichtbaar zijn.
- De temperatuur tijdens de toepassing moet lager zijn dan 25°C.
- Er dient minimaal 10 - 12 uur droog weer te volgen op de bespuiting.
- Gebruik 400 – 500 l water en voeg geen uitvloeier toe.

## MH in 2e jaars plantuien voor de lange bewaring

Voor 2<sup>e</sup> jaars plantuien die bewaard moeten worden tot na december of waarvan het nog niet zeker is hoelang ze bewaard gaan worden, is het advies om tijdig **3,75 kg Royal MH + uitvloeier** in te zetten.

Het moment dat het loof begint te strijken, is in een onregelmatig gewas 2<sup>e</sup> jaars plantuien niet altijd de juiste indicatie voor het juiste spuitmoment. Controleer altijd of bij de meeste planten de bol-nek verhouding minimaal 1:3,5 is.

Gebruik voor een goede bedekking ongeveer 500 l water en spuit op een vitaal en niet afgehard gewas. Voor een goede opname is 10 uur droog weer na de bespuiting nodig. De uien dienen voor voldoende opname nog min. 2 weken aan de groei te blijven.

## Tijdstip voor pré-harvest nadert snel

Vooraf voor de bestrijding van veenwortel is een pré-harvest toepassing met glyfosaat de beste strategie omdat het onkruid dan maximaal ontwikkeld is. In de stoppel zal het zich niet meer voldoende herstellen. Tevens worden ook andere aanwezige wortelonkruiden, doorwas-aren (verlaging van het vochtgehalte) en aardappelopslag bestreden.

De tarwe rijpt momenteel snel af. Wanneer er een nagelafdruk in de tarwekorrels gemaakt kan worden en het bladgroen is verdwenen kan er minimaal 7 dagen voor de oogst een pré-harvest bespuiting uitgevoerd worden met **5 – 6 l Glyfosaat** of **3,5 – 4,5 l Roundup Ultimate**. Haagwinde kan het beste enkele weken voor de oogst met **99 ml Primus** bestreden worden.

## Voorkom botrytis en sclerotinia in stamslabonen

Aantasting door botrytis en sclerotinia in stamslabonen vindt vooral plaats bij een hoge luchtvochtigheid of een nat gewas via kleine wondjes of afgevallen bloemblaadjes. Zorg daarom voor een tijdige bescherming door de eerste bespuiting uit te voeren zodra de eerste bloemblaadjes zichtbaar worden, het zgn. “witte knoppenstadium”.

Voer de eerste bespuiting uit met **0,5 l Luna Privilege** (zonder uitvloeier). Voor de beste bescherming ongeveer 10 dagen later een tweede bespuiting uitvoeren met **1 kg Switch + uitvloeier** of **0,75 kg Safir 50WG + uitvloeier**.

Gebruik veel water, een fijne druppel en een lage rijsnelheid voor een zo goed mogelijke indringing in het gewas.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.