

Let op insectenvraat in bieten

Controleer bieten vanaf de opkomst regelmatig op vretelij. Momenteel zijn vooral aardvlooien en bovengrondse springstaarten te vinden. De schade die zij veroorzaken valt veelal erg mee. Voer alleen bij zeer ernstige schade een bestrijding uit met een pyrethroïde. Bij aanwezigheid van vliegende bietenkevertjes of bladluizen is het advies om een bestrijding uit te voeren met **0,15 – 0,25 l Calypso/ Bariard**. Voer een insectenbestrijding bij voorkeur 's avonds uit en gebruik veel water.

Voor de bestrijding van bladluizen en tripsen heeft Batavia een tijdelijke toelating gekregen in suikerbieten. De toelating geldt voor de periode van 15 april tot 13 augustus 2020. De adviesdosering is **0,45 l Batavia**. Batavia mag twee keer toegepast worden met een interval van twee weken. Bewaar de bijgevoegde "[Vrijstelling Batavia suikerbieten 2020 WG](#)" in uw administratie of bestrijdingsmiddelenkast wanneer Batavia toegepast gaat worden in de bieten.

Vanaf vorige week is de bladluiswaarschuwingsdienst van start gegaan in het zuidwesten van Nederland. Zodra op meerdere percelen de schadedrempel wordt overschreden zullen de telers in dat gebied een SMS-bericht van Suiker Unie ontvangen om hun eigen bietenpercelen te controleren.

Groei regulatie en ziektebestrijding in wintertarwe

In Theunisse TIP#2 schreven wij al over de groei regulatie en ziektebestrijding in wintertarwe. De groei van de tarwe is echter niet geweest zoals we verwacht hadden. Late percelen moeten daarom vaak nog voor de eerste keer gespoten worden met een groei regulator. De ziektedruk blijft over het algemeen laag. Wel komen we regelmatig lichte aantasting van gele roest tegen. Het is echter maar de vraag of dit onder de huidige weersomstandigheden snel uit zal breiden.

Het advies voor de eerste groei regulatie is einde uitstoeling – begin strekking van het gewas **0,5 l CeCeCe + 0,4 kg Prodax**. De tweede groei regulatie dient 7 – 10 dagen later of uiterlijk bij het verschijnen van de tweede knoop (gewas lengte ca. 25 – 30 cm) uitgevoerd te worden. Het advies voor de tweede bespuiting is **0,5 l CeCeCe + 0,3 kg Prodax**. Op minder legeringsgevoelige rassen kan evt. volstaan worden met **0,5 – 1 l CeCeCe**. Pas een groei regulator toe op een gewas dat niet in stress verkeerd.

Het verschijnen van de tweede knoop (gewas lengte 25 – 30 cm) is ook het moment om de T1 ziektebestrijding uit te voeren. Wij adviseren hiervoor **1 l Adexar**. De uitbreiding van gele roest kan een reden zijn het tijdstip van de toepassing iets naar voren te halen. In de praktijk wordt de T1 bespuiting vaak gecombineerd uitgevoerd met de tweede groei regulatie.

Bodemherbiciden aanvullen in uien na opkomst

Onder de huidige droge omstandigheden is het niet de eerste gedachte om bodemherbiciden in te zetten of aan te vullen. Blijf voor de toediening van een bodemherbicide echter alert op momenten zoals afgelopen zaterdag, toen er op veel plaatsen toch nog enkele mm neerslag vielen, of maak gebruik van een te geven beregeningsbeurt aan het gewas.

Wanneer de meeste plantuien boven staan is het zaak de bodemherbiciden aan te vullen, dit kan bijvoorbeeld met een combinatie van **1 - 1,5 l Wing P + 0,5 – 0,75 l Stomp + 0,5 – 0,75 kg Pyramin* + (0,75 – 1 l Intruder/Certis Chloor IPC)**.

Zodra de zaaiuien boven staan is het advies om **0,2 l AZ 500 + 0,5 – 1 l Wing P** te spuiten. Wanneer er sprake is van een zeer onregelmatige opkomst is het veiliger om bv **0,5 – 0,75 l Stomp + (0,5 – 0,75 l Intruder /Certis Chloor IPC)** in te zetten.

Intruder (Chloor IPC) heeft naast bodemwerking ook contactwerking op veel onkruiden. Onder vochtige en koude omstandigheden heeft het de beste werking. Spuit het daarom altijd in de avond wanneer de temperatuur < 17°C is en herhaal de bespuiting indien nodig met intervallen van 5 – 7 dagen. Houdt een afstand van 200 m aan van bloeiende fruitbomen, vlas of blauwmaanzaad!

*) Pyramin DF is niet meer leverbaar maar mag nog opgebruikt worden tot 1-7-2020.

Korte TIPS

- Net als bij suikerbieten zijn ook de ongekiemde zaden van cichorei erg gewild bij bosmuizen. Zorg daarom ook hier voor alternatief voer zolang het zaad nog niet gekiemd is.
- De toelating van de werkzame stof epoxiconazool wordt per 31-10-2020 beëindigd. Dit betekent dat de middelen **Osiris, Adexar, Ceriix en Retengo Plust** na deze datum niet meer afgeleverd mogen worden. Zij mogen in 2021 nog opgebruikt worden in de teelten waarin zij toegelaten zijn.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.