

Blijf alert op trips

In veel uien is de laatste tijd een bespuiting uitgevoerd met Batavia om de ontwikkeling van tripsen te voorkomen. Ondanks het minder gunstige weer voor de ontwikkeling van tripsen is het advies, wanneer er geen volwassen tripsen gevonden worden, om na 2 weken de bespuiting met **0,75 l Batavia + 1 – 2 l Robbester** te herhalen. Gebruik de hoogste dosering Robbester wanneer er een duidelijke waslaag op de uien aanwezig is.

Volwassen tripsen worden door Batavia niet bestreden. Houdt hier ook rekening mee wanneer er de komende periode tripsen uit geogoste percelen graszaad, wintergerst of plantuien komen “fourageren” in uw uienperceel.

Kies voor **0,75 l Benevia + 1 l Robbester** of **0,2 l Tracer + 2 – 4 kg Biosweet + uitvloeier** wanneer er ook volwassen tripsen bestreden moeten worden. Gebruik 350 – 400 l water en spuit later op de avond. Voor de toepassing van Benevia is een DRT97,5% vereist!

Bladschimmels in suikerbieten vragen de aandacht

De BAS-app van Cosun Beet Company waarschuwt momenteel op veel bietenpercelen voor grote kansen op infectie van cercospora en stemphylium. Een tijdige start van de bescherming tegen bladschimmels is erg belangrijk.

Voer de eerste bespuiting uit wanneer de eerste aantasting met cercospora of stemphylium wordt aangetroffen. In de praktijk zien we steeds vaker dat de eerste bespuiting standaard begin juli uitgevoerd wordt.

Wij adviseren voor de eerste bespuiting **1 l Bicanta** (max. 2 keer; interval 21 dgn; v.t. 35 dagen) en voor de tweede bespuiting **1 l Retengo Plus*** (max. 1 keer; v.t. 28 dgn) of **1 l Spyrle** (max. 2 keer; interval 21 dgn; v.t. 28 dgn.; DRT 90-95%).

De effectiviteit van de bespuitingen kan verbeterd worden door het toevoegen van **0,4 l Promotor** aan iedere bespuiting. Ook zijn er de laatste jaren goede ervaringen opgedaan met het toevoegen van een koperhoudende bladmeststof zoals bijvoorbeeld **3 l Vitalosol Gold**. Deze bladmeststof bevat koper, mangaan en zwavel. Vitalosol als eerste aan de tank toevoegen.

Gebruik ca. 300 l water per ha en spuit op rechtopstaand fris blad. Laat zeker wanneer sprake is van veel nieuwe bladgroei, de interval met de volgende bespuiting niet langer duren dan 2 - 3 weken!

*) De aflevertermijn voor Retengo Plus(t) is afgelopen, de opgebruiktermijn loopt tot 31 oktober 2021.

Ziektebestrijding in knolselderij

Bij bladnatperioden van 12 uur of langer bestaat het gevaar dat knolselderij geïnfecteerd wordt door bladvlekkenziekte. Vanaf juli neemt het aantal dauwnachten duidelijk toe en dus ook de kans op langere bladnatperioden. Het tijdstip waarop er gestart moet worden met een preventieve ziektebestrijding is o.a. afhankelijk van de ontwikkeling van het gewas, de ziektegevoeligheid van het ras en de weersomstandigheden. Een B.O.S. kan hierbij een goede ondersteuning zijn.

Een sterk schema voor de ziektebestrijding is bijvoorbeeld **0,4 l Score - 0,5 l Luna Sensation – 1 l Dagonis SC – 1 l Amistar Top – 1 l Dagonis – 1 l Amistar Top**. Luna Sensation en Amistar Top hebben de sterkste werking tegen sclerotinia. De werkingsduur van alle toegelaten fungiciden in knolselderij bedraagt ca. 2 weken.

Bladbemesting met Powerleaf Kali

Vooraf bij een sterke groei van de planten neemt de behoefte aan kali sterk toe. Voor aardappelen en uien is dit veelal gaande in juli – begin augustus. Het strooien van kali op grote werkbreedtes geeft vaak lichte beschadigingen van het blad, terwijl ook de verdeling minder egaal is. Bladbemesting met Powerleaf Kali heeft deze nadelen niet en is daardoor een heel efficiënte manier om kali toe te dienen aan aardappelen, uien, knolselderij en wortelen.

Vanaf de knolzetting in aardappelen en begin bolvorming in uien kan dit door wekelijks **6 x 2,5 l Powerleaf Kali** of iedere twee weken **3 x 5 l Powerleaf Kali** te spuiten. Op deze manier kan met Powerleaf Kali 100 kg zuivere kali vervangen worden.

Bij een lage bodemvoorraad kali moet de bladbemesting, zeker in aardappelen, altijd gezien worden als een aanvulling op de K – basisbemesting. Powerleaf Kali is zacht voor het gewas en kan goed gecombineerd gespoten worden met fungiciden (ook met Fandango) en virusolie.

Korte TIPS

- Ons **Groenbemester Rassenadvies 2021** is uit, vraag ernaar bij u adviseur of [download hier](#).
- Aanstaande woensdag 7 juli kunt u ons proefveld bezoeken, graag voordien aanmelden. [Klik hier om aan te melden](#).

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.