

Wortelonkruid en aardappelopslag in granen

De wintertarwe ontwikkelt zich momenteel snel. Wanneer er nog wortelonkruiden of overgebleven zaadonkruiden bestreden moet worden dient dit vóór het verschijnen van het vlagblad (Tapir en Starane Top) of ruim voor het verschijnen van de aren (MCPA) plaats te vinden. Afhankelijk van het onkruidbestand kan o.a. gekozen worden voor één van de volgende combinaties:

- Akkerdistel en akkerpaardenstaart: **2 l MCPA**
- Akkerdistel, akkermelkdistel, akkerpaardenstaart, veelknopigen en kamille: **1 l Tapir + 2 l MCPA**
- Haagwinde, veenwortel, veelknopigen en kamille: **1 l Tapir + 0,75 l Primstar**
- Aardappelopslag: **0,6 l Starane Top** of **1 l Tapir/ Primstar + 0,3 l Starane Top**

Er is alleen voldoende bestrijdingseffect te verwachten wanneer onder groeizame weersomstandigheden gespoten wordt. Gebruik minimaal 400 l water/ha en zorg d.m.v. een lage rijsnelheid voor een zo goed mogelijke indringing in het gewas.

Onkruidbestrijding na opkomst erwten

In conservenerwten kunnen jonge onkruiden na opkomst, in elk stadium van het gewas, bestreden worden met:

- **0,3 – 0,5 l Basagran* + 0,25 l Webo Wett/ 0,3 l Promotor** (Bij nieuw onkruid de bespuiting herhalen (interval min. 7 dagen))

Vanaf ca. 5-10 cm gewas lengte kan de dosering verhoogd worden naar:

- **1 – 1,5 l Basagran** + 0,25 l Webo Wett/ 0,3 l Promotor**
- **1 l Basagran* + 0,5 l Oblix 500 SC*** (Oblix 500 SC versterkt de werking op o.a. melde en zwaluwtong)

*) Basagran bij dagtemperaturen >20°C pas tegen de avond spuiten. Gebruik niet meer dan 2 l Basagran per teelt.

**) De toelating van Oblix 500 SC is verkregen door een KUG, toepassing komt voor risico van de gebruiker.

Onkruidbestrijding vanaf opkomst cichorei

Vanwege de beperkte mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding na opkomst in cichorei, is het erg belangrijk om onkruiden al zo vroeg mogelijk aan te pakken. Dit kan nog op de volgende manier.

- Tijdens de opkomst: **7 gram Safari/ (15 gram Safari*) + 0,25 l Kerb Flo + 0,25 l Webo Wett**
- Vanaf volledige opkomst: **10 gram Safari/ (15 gram Safari*) + 40 ml AZ 500 + 0,25 l Kerb Flo + 0,25 l Webo Wett**
- 2-bladstadium: **10 gram Safari/ (35 gram Titus*) + 60 ml AZ 500 + 0,25 l Kerb Flo + 0,25 l Webo Wett**

Het gebruik van Titus heeft een meerwaarde op de bestrijding van klein kruiskruid, melganzevoet, melkdistel en grassen. Kies voor Safari wanneer zwarte nachtschade, perzikkruid, knopkruid en bingelkruid bestreden moeten worden.

*) Titus en de verhoogde dosering Safari kunnen alleen veilig toegepast worden in de SU-tolerante rassen!

Afrijpingsziekten (T2) en overbemesting wintertarwe

In de wintertarwe is de druk van septoria door het wisselvallige weer hoog. Gele roest komen we soms tegen in gevoelige rassen, zoals Reform. Meeldauw onderin het gewas komt vrij algemeen voor dit jaar, het vraagt meestal geen aparte bespuiting.

De werkingsduur van de T1 bespuiting bedraagt ca. 3 weken. Wanneer deze bespuiting half april of eerder heeft plaatsgevonden, is de tarweplant momenteel dus niet meer beschermt. Wanneer het wisselvallig weer aanhoudt is het advies om op deze percelen de T2 bespuiting wat naar voren te halen en niet te wachten tot het vlagblad helemaal uit is. Gebruik eventueel ¾ van de dosering en voer zodra de aar uit is een T3 bespuiting uit.

Wacht op percelen die nog beschermd zijn met de T2 bespuiting tot het vlagblad volledig uit is. Ons advies voor de T2 bespuiting:

- **1,5 l Revytrex**
- **1 l Elatus Era**

In de tarwe worden regelmatig bladluizen aangetroffen, deze kunnen bestreden worden met **140 gram Teppeki** of een pyrethroïde zoals **50 ml Karate Zeon, 0,2 l Somicidin Super** of **0,25 l Decis EC**. Pyrethroïden hebben ook een nevenwerking op de larven van het graanhaantje.

De fungicidenbespuiting op het vlagblad kan goed gecombineerd worden met een bladmeststof om de derde N-gift te geven. Gebruik hiervoor **20 l Powerleaf Stikstof Plus**. Spuit op een droog gewas met max. 250 l spuitvloeistof/ha.

Korte TIPs

De gewassen ontwikkelen zich momenteel zeer snel. De onkruid- en ziektedruk (o.a. valse meeldauw, bladluizen, slakken en septoria) is hoog. Laat u niet verrassen, controleer uw gewas regelmatig en benut de (schaarse) spuitmomenten.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.