

Onkruidbestrijding in wintergranen

Op veel percelen wintertarwe is de eerste stikstof gegeven, behalve de tarwe zal ook de onkruidgroei hierop snel reageren. Op de vroeg gezaaide percelen die in het najaar niet gespoten zijn treffen we al flink ontwikkeld onkruid aan.

Voer de onkruidbestrijding bij voorkeur vóór het toedienen van drijfmest (sleepslangen) uit omdat het onkruid anders te veel besmeurd kan zijn.

Wintertarwe

Sterke en breed werkende combinatie, ook op grassen:

- **200 gram Atlantis Star + 200-225 gram Capri Twin + 1 l Robbester**
(Voeg bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel en duivenkervel **0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toe**).

Wanneer de bestrijding van straatgras minder belangrijk is:

- **225 - 275 gram Capri Twin + 1 l Robbester**
(Voeg bij aanwezigheid van grotere paarse dovenetel en duivenkervel **0,3 l Starane Top of 70 gram Biathlon 4D toe**).

Sterk op grassen maar zwak op klein kruiskruid, kleeftkruid en klimopbladereprijs:

- **180 - 200 gram Cossack Star + 1 l Robbester**
(Bij een dosering >180 gram dient een DRT90 gebruikt te worden).

Wintergerst en wintertarwe

Wanneer geen grassen bestreden hoeven te worden of wanneer er gras onder gezaaid is:

- **1 l Tapir + 0,75 l Renitar/ (1,5 l MCPA bij aanwezigheid van distels en uitstaande melde)**
(Bij aanwezigheid van ereprijssoorten **1 - 1,5 l Fox 480 SC of 70 gram Biathlon 4D + 1 l Robbester toevoegen**)).

Grassen bestrijden:

- **0,8 - 1,2 l Puma Extra + 1 l Robbester**

Voor een goede werking van de middelen die grassen moeten bestrijden is groeizaam weer met een dagtemperatuur >5°C, geen nachtvorst en een RV van minimaal 60% gewenst. Deze RV wordt midden op de dag bij een oosten- of noordenwind zelden gehaald.

Wanneer ten tijde van de onkruidbestrijding de eerste groeiregulatie aan de orde is, het gewas is dan in het stadium 'einde uitstoeling' - '1^e knoop voelbaar', adviseren wij niet om middelen als Prodax of Moddus Evo aan de onkruidbestrijdingsmiddelen toe te voegen. Kies in een dergelijk geval voor **0,75 - 1 l CeCeCe** of hanteer een interval van een week tussen de onkruidbestrijding en de groeiregulatie.

Mangaangebrek in wintergraan

Op percelen wintergraan met een hoge pH zien we nogal eens pleksgewijs een lichte verkleuring die is ontstaan door mangaangebrek. Ook wanneer de grond erg los is laat het gebrek zich gemakkelijk zien. Kenmerkend hierbij zijn de vastgereden rijsporen die het gebrek niet tonen.

Mangaangebrek is op te heffen door een mangaanmeststof zoals **0,5 - 1 l Mangaan Plus/ Mantrac** te spuiten. De meststof kan ook aan de onkruidbestrijding toegevoegd worden. De behandeling eventueel herhalen.

Korte TIPS

- Direct na zaai van blauwmaanzaad kan, afhankelijk van de zwaarte van de grond, **0,1 - 0,15 l Centium 360 CS** gespoten worden. Centium 360 CS kan na veel neerslag weleens plantwegval veroorzaken in blauwmaanzaad. Dit jaar krijgt Laudis een toelating voor de onkruidbestrijding na opkomst. De toelating is tot stand gekomen door een KUG.
- Zet direct na zaai van spinazie, afhankelijk van de zwaarte van de grond, **0,1 - 0,15 l Centium + 1 - 1,5 kg Goltix WG** in. Het advies is om op zandgrond maximaal **1 kg Goltix WG** te gebruiken. Let op dat alleen Goltix WG hiervoor is toegelaten!
- Vergeet niet om tijdig aan ons door te geven of wij de monitoring van de uienvlieg in uw zaaiuien mogen verzorgen dit jaar. Door een wekelijkse controle van de lokvallen kunnen wij u snel informeren of een bestrijding wel of niet nodig is.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.