

Onderschat de waarde van bodemherbiciden in bieten niet

Een bodemherbicide aan de basis in bieten heeft meerdere voordelen. Zo geeft het meer ruimte om een na-opkomst onkruidbestrijding wat uit te stellen wanneer bijvoorbeeld de weersomstandigheden een bespuiting niet toelaten. Daarnaast maakt het onkruid gevoeliger voor een na-opkomstbespuiting en is het voor de bestrijding van onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid eigenlijk onmisbaar.

Wanneer kamille wordt verwacht:

- **2 – 3 l Goltix/ Bettix**

Wanneer o.a. hondspeterselie, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid wordt verwacht:

- **50 – 100 ml Centium 360 CS**
(Op zandgrond of wanneer sprake is van een slechte structuur, de laagste dosering aanhouden i.v.m. kans op schade (witverkleuring)).

Een veilige combinatie (ook op zandgrond) die de voordelen van beide bovenstaande middelen combineert:

- **2,5 l Kezuro + 50 ml Centium 360 CS**

Onkruidbestrijding en startfosfaat in zaaiuien

Voor een vlotte beginontwikkeling, meer planten en een hogere opbrengst van de zaaiuien is het belangrijk dat er voldoende direct beschikbaar fosfaat in de bodem aanwezig is. Om dit te bewerkstelligen is het advies om tijdens het zaaien een startfosfaat zoals **30 l Powerstart Flores (0-30-5)** als rijenbehandeling op het zaad te spuiten.

Voor een goede basis van de onkruidbestrijding blijft het advies om, afhankelijk van de zwaarte van de grond, bij voorkeur direct na zaai **0,75 – 1 l Stomp 400 SC** op een nog (zaai)vochtige grond te spuiten. Bij deze lage doseringen Stomp 400 SC hoeft niet gewacht te worden tot het zaad gekiemd ligt. Zorg wel dat het uienzaad minimaal 2 cm diep gezaaid en goed bedekt is. Spuit nooit vlak voor heel veel neerslag!

Onkruidbestrijding in cichorei start al voor zaai

In cichorei en witlof zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt nog steeds zeer beperkt. Werk daarom tijdens de zaaibedbereiding **8 l Bonalan** in. Het beste effect wordt verkregen wanneer Bonalan over de ploegsneden gespoten wordt en daarna binnen 2 uur ingewerkt wordt. Gaat u stuifdek gerst inzaaien, gebruik dan 20% meer zaaizaad na gebruik van Bonalan. Daarnaast blijft het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met **2,5 l Kerb Flo** volvelds of in de rij.

De toelating van Bonalan wordt beëindigd, de aflevertermijn is 12 februari 2024 en de opgebruiktermijn loopt tot 12 mei 2024.

Bodemherbiciden in peulvruchten

In conservenerwten, kapucijners en veldbonen is het advies om direct na zaai een bodemherbicide te spuiten. Gebruik hiervoor, afhankelijk van de zwaarte van de grond, **0,15–0,2 l Centium 360CS + 0,75–1,5 l Challenge**.

Challenge heeft geen toelating in tuinbonen, vandaar het advies om hier kort na zaai **1,8 kg Novitron Dam tec** te spuiten. Deze bespuiting is vergelijkbaar met 0,15 l Centium 360 CS + 1,5 l Challenge.

Ritnaalden in aardappelen en maïs

Voor de bestrijding van ritnaalden in aardappelen en maïs is er onlangs een toelating verleend om een rijenbehandeling uit te voeren met **15 kg Karate 0,4 GR**. In aardappelen adviseren wij deze behandeling wanneer geen Nemathorin ingezet kan worden vanwege een te korte groeiduur (<120 dagen). In andere gevallen blijft het advies **7,5 kg Nemathorin** in de rij.

In maïs kan het de Force Evo vervangen, die dit jaar wegens problemen met de productie niet leverbaar is.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.