

Onkruidbestrijding in zomergranen

Wacht met de onkruidbestrijding tot de meeste onkruiden gekiemd zijn. Komen ook aardappelopslag en wortelonkruiden voor, dan kan de bestrijding beter wat uitgesteld worden tot deze onkruiden wat verder ontwikkeld zijn.

In zomertarwe (o.a. ook tegen windhalm, jonge duist en ereprijs):

- **130 gram Capri Twin + 0,35 l Pixxaro/ 0,75 l Renitar + 1 l Robbester**

In alle zomer- en wintergranen (niet werkzaam tegen grassen en ereprijs):

- **1 l Tapir + 0,35 l Pixxaro/ 0,75 l Renitar**

Voeg aan bovenstaande combinaties **1 – 2 l MCPA** toe wanneer ook distels of uitstaande melden bestreden moeten worden.

*) Pixxaro en Renitar versterken de werking op o.a. paarse dovenetel, hoenderbeet, melden en duivenkervel; Pixxaro dient altijd gespoten te worden met een DRT95, Renitar op percelen langs oppervlaktewater spuiten met een DRT95.

Ziektebestrijding en groeiregulatie wintergerst

Het duurt niet lang meer voordat de vroegste wintergerst zijn kafnaalden laat zien. Wanneer het vlagblad helemaal uit is, is het tijd voor de T2 ziektebestrijding en een eventuele extra groeiregulatie wanneer het gewas te zwaar dreigt te worden.

Ons advies voor de T2 ziektebestrijding is:

- **1,25 l Balaya + 0,5 - 1 l Mangaan Plus/ Mantrac**
- **1,5 l Revytrex + 0,5 - 1 l Mangaan Plus/ Mantrac**

Tot het verschijnen van de kafnaalden kan er nog een extra groeiregulatie plaatsvinden met **1 – 1,25 l Yatze** om het zgn. “aarknikken” te voorkomen. Deze bespuiting kan gecombineerd uitgevoerd worden met de ziektebestrijding.

Mangaanvoeding en ziektebestrijding plantuien

In de 2^e jaars plantuien en de winteruien is het advies om met de ziektebestrijding te starten wanneer de uien ca. 4 pijpjes hebben en wanneer de omstandigheden voor het ontstaan voor valse meeldauw aanwezig zijn (stilstaand water, bv door dauwnachten). Een tijdige start is belangrijk omdat we alleen maar over preventief werkende middelen beschikken.

Ga voor de ziektebestrijding van start met:

- **0,5 l Zorvec Endavia** (max. 3 keer)
- **1,6 l Infinito** (max. 2 keer)

Zorvec Endavia heeft de voorkeur wanneer er sprake is van een hoge ziektedruk.

In plantuien wordt bij de ziektebestrijding vaak extra mangaanvoeding mee gespoten, dit kan o.a. in de vorm van **3 – 5 l Vitalosol Gold*** of **0,5 – 2 l Powerleaf Mangaan Plus** of **5 l Powerleaf Mn- Mg nitraat**.

*) Vitalosol Gold geeft niet alleen mangaanvoeding maar verhoogt ook de weerstand van de plant en zorgt voor extra vitaliteit. Vóór gebruik het product goed schudden en als eerste toevoegen aan de tank wanneer deze voor 2/3 is gevuld met water.

Korte TIPs

- Op grond waar veel sclerotinia te verwachten is en waar een hiervoor gevoelig gewas geteeld gaat worden is het advies om vóór de teelt **2 – 4 kg Contans** oppervlakkig (3-5 cm) in te werken. Bewaar Contans koel, de houdbaarheid is 2 jaar bij 4°C, 2 weken bij 20°C en 3 weken bij 15°C.
- Vanaf 15 april dienen afvalhopen van aardappelen en uien deugdelijk afgedekt te zijn. Wanneer de NAK bij controle constateert dat er door phytophthora of valse meeldauw aangetaste planten aanwezig zijn, wordt er direct een rode kaart afgegeven en kan er via tuchtrecht een geldboete worden opgelegd.
- Zie voor adviezen over de inzet van bodemherbiciden in diverse gewassen Theunisse TIP#4 van 31 maart 2023.
- Amistar heeft een tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de zaadteelt van Engels raaigras tegen zwarte roest verkregen. Deze vrijstelling treedt in werking op 1 mei 2023 en vervalt op 28 augustus 2023.
- **Op Koningsdag, donderdag 27 april, zijn wij met een beperkte bezetting geopend.**

Gebbruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.