

## Aanvulling bodemherbiciden zaaiuien

Voorkómen van onkruid blijft de beste tactiek voor een geslaagde onkruidbestrijding in uien. Vergeet daarom in het kramstadium ook niet om de bodemherbiciden aan te vullen. Een sterk advies hiervoor is **0,2 l AZ 500\*** (éénmalig) + **0,5 - 1 l Wing P\*\***.

\*) AZ500 heeft voor een goede werking minimaal 10-15 mm neerslag nodig. Zet het daarom zo vroeg mogelijk in. Dit kan ook veilig gebeuren onder droge omstandigheden en wanneer de opkomst tweewassig is.

\*\*) Wacht met de toediening van Wing P tot de uien volledig in het kramstadium staan, er géén sprake is van nachtvorst en er de eerste dagen na de bespuiting géén grote hoeveelheden neerslag worden verwacht. Bij twijfel kan Wing P altijd vervangen worden door **0,5 - 0,75 l Stomp 400 SC**.

## Groeiregulatie in zomergranen

In zomertarwe wordt met een éénmalige inzet van **1 - 1,25 l CCC** aan het einde van de uitstoeling meestal voldoende halmversteving verkregen om legering te voorkomen. Wanneer een extra zwaar gewas wordt verwacht kan ook gekozen worden voor een éénmalige toepassing van **0,5 l CCC + 0,4 kg Prodax** op het moment van einde uitstoeling – begin schieten.

In zomergerst is het advies om voor het verschijnen van de tweede knoop **0,3 - 0,4 l Moddus EVO** te spuiten. Tenslotte kan, tot het verschijnen van de kafnaalden, de lengtegroei nog geremd worden met **0,6 - 0,8 l Yatze**, dit om aarknikken te voorkomen.

## Onkruidbestrijding stamslabonen

Voer voor de onkruidbestrijding in stamslabonen direct na zaai een bespuiting uit met **0,15 l Centium 360 CS + 2 l Fresco**.

Het is een goede gewoonte om het zaai- of plantbed voor de teelt van later te planten of te zaaien gewassen zoals stamslabonen tijdig klaar te leggen. Er kan dan al veel onkruid gekiemd zijn voordat er gezaaid of geplant gaat worden.

Het bovenstaande onkruid dient vóór zaai afgebrand te worden met o.a. **2 - 3 l Etna/ Glyfall** of **1,4 - 3,2 l Roundup Dynamic**.

## Bodemherbiciden in aardappelen

De weersomstandigheden lijken volgende week ideaal voor het toedienen van de bodemherbiciden op al aangefreemde aardappelen. Veel gebruikte combinaties zijn o.a.:

- **4 l Boxer + 0,5 l Sencor SC** (Veelgebruikte mix die versterkt kan worden met: **0,15 l Centium\*\***(zwaluw tong), **1,5 l Challenge** (melden) of **2 l Gofor\*** (melden, doornappel, zwaluwtong, nachtschade)).
- **3 - 4 l Boxer + 2,5 l Proman** (Zacht voor het gewas, daarom ook zeer geschikt voor pootaardappelen).
- **0,2 l Centium\*\* + 1,5 l Challenge/ 2 l Gofor\* + (0,4 l Sencor SC/ 1,5 l Proman)** (Geschikt voor milieukeur-aardappelen of als basis in combinatie met na opkomst bespuitingen).

Let er bij de keuze op of het ras Sencor verdraagt en zorg dat Challenge, Gofor en Centium ruim vóór opkomst gespoten worden. Challenge en Gofor kunnen grote schade aanrichten aan fruit en jonge bietenplantjes, voorkom drift en thermiek hiernaartoe!

\*)Gofor heeft wel een toelating in pootaardappelen maar wordt vanwege mogelijke gewasreacties hierin niet geadviseerd! Op percelen grenzend aan oppervlaktewater een DRT95 gebruiken. \*\*) Centium 360 CS heeft geen toelating in pootaardappelen.

Tot aan de opkomst kan bovenstaand onkruid nog bestreden worden met **0,4 l Quickdown + 1 l olie**. Ook kan de contactwerking op onkruid van een mix met Sencor SC, vóór opkomst versterkt worden door er **1-2 l olie** aan toe te voegen.

## Wees alert op bladluizen in bieten

Controleer vanaf opkomst de bietenplantjes wekelijks op aanwezigheid van luizen. De schadedrempel voor een bestrijding is:

- Wanneer op 30 - 50% van de planten kolonievorming van zwarte bonenluis te vinden is.
- Er  $\geq$  2 groene perzikbladluizen per 10 planten gevonden worden.

Voor de bestrijding kan gebruik worden gemaakt van **0,45 l Batavia + 1 l Robbester** (heeft ook werking op trips maar heeft een trage aanvangswerking, max. 2 keer) of **140 gram Tepeki WG** (max. 1 keer; tot het 10 bladstadium en uiterlijk tot 1 juni).

Voer de bespuiting, eventueel in combinatie met de LDS, 's avonds uit bij een hogere RV en gebruik 300 - 400 l water.

## Korte TIPs

- Controleer gewassen zoals suikerbieten en kolen regelmatig op slakkenvraat. Met wisselvallig weer en op percelen met een groenbemester als voorvrucht is de kans op schade door slakken groot. Strooi op percelen waar schade wordt waargenomen of verwacht tijdig **7 kg Derrex slakkenkorrels**.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.