

Bladluizen in suikerbieten

Ondanks dat in de meeste bieten al een bestrijding van bladluizen heeft plaatsgevonden zien we momenteel weer een duidelijke toename op veel percelen. Blijf de bieten regelmatig controleren op aanwezigheid van luizen. Wanneer meer dan 2 groene luizen per 10 planten of wanneer op minstens de helft van de planten zwarte bonenluizen aangetroffen worden, is het advies een bestrijding uit te voeren. Tot het 10-bladstadium van de bieten is dit mogelijk met **140 gram Teppeki** of **Afinto** (er is slechts één toepassing per teelt toegestaan). Voer de bespuiting uit tijdens een hoge RV en gebruik minimaal 300 – 400 l water per ha.

Er is onlangs een tijdelijke vrijstelling verleend tot 15 juli 2025 om bladluizen in bieten te bestrijden met 0,5 l Exirel (+ 2 l Robbester). Het middel wordt via een gecontroleerde distributie verstrekt, kijk voor de voorwaarden op de [site van Cosun](#).

Start tijdig met de bestrijding van trips in uien

In tweedejaars plantuien en vroeg gezaaide zaaiuien treffen we trips aan. Voor een vroege teelt is dit niet zo zorgelijk, voor late plantuien en zaaiuien adviseren wij om het gewas regelmatig te controleren op de aanwezigheid van trips. Vooral onder droge weersomstandigheden en hoge temperaturen kan de ontwikkeling van trips razendsnel gaan.

Bij aanwezigheid van larven van trips in de uien is ons advies een bespuiting uit te voeren met **0,75 l Batavia + 1 - 2 l Robbester***. Voor een goede opname Batavia niet mengen met andere middelen en de bespuiting uitvoeren op een goed groeiend gewas.

Als alternatief voor Batavia, dat niet meer leverbaar is, of wanneer ook al volwassen tripsen aangetroffen worden, kan een bestrijding met **0,75 l Benevia + 1 - 2 l Robbester*** of **0,2 l Tracer + 2 l Lokfructose + uitvloeier** uitgevoerd worden. De werkingsduur van Batavia en Benevia bedraagt ca. 2 weken, van Tracer is dit 7 tot 10 dagen.

Benevia mag met een DRT95 gespoten worden wanneer er sprake is van een teeltvrije zone van 275 cm!

*) 1 l Robbester kan vervangen worden door **0,25 l WellPower**.

Bladbemesting met Powerleaf Quattro Plus in o.a. aardappelen

Bladbemesting met Powerleaf Quattro Plus is een strategische keus om op een efficiënte manier stikstof in de plant te krijgen. Op deze manier kan er een besparing gerealiseerd worden op de totale hoeveelheid te geven N waardoor stikstofruimte gespaard wordt voor o.a. organische bemesting. Zo kan met 150 l Powerleaf Quattro Plus (33 kg N) 200 kg KAS (54 kg N) vervangen worden.

Al een groot aantal jaren zijn er goede ervaringen en proefresultaten met Powerleaf Quattro Plus. Powerleaf Quattro Plus is een meststof die het blad naast stikstof, mangaan, magnesium ook van calcium voorziet.

In aardappelen is het advies is om van start te gaan met de overbemesting wanneer de nieuwe knollen in het “erwtjesstadium” zijn. Voeg hiervoor aan de ziektebestrijding b.v. **3 x 50 l** of **6 x 25 liter Powerleaf Quattro Plus** toe. Gebruik in combinatie met virusolie nooit meer dan 20 l Powerleaf Quattro Plus. Toepassing is op eigen risico!

Niet meer dan 250 liter spuitvloeistof per ha (inclusief meststof) gebruiken en altijd op een droog gewas spuiten om het “lopen” van de meststof naar de bladranden te voorkomen.

Ook in andere gewassen zoals b.v. uien, erwten, suikerbieten of wortelen kan, wanneer sprake is van voldoende bladmassa, een overbemesting of oppepper worden gegeven met **15 – 20 l Powerleaf Quattro Plus**.

Korte TIPs

- Ook in aardappelen neemt de luizendruk toe. De luizen zitten vooral op de onderste bladeren. Gebruik voor de bestrijding ervan **0,25 kg Gazelle** of **0,5 l Sivanto Prime + 1 l olie**. in minimaal 300 l water voor voldoende indringing. Met deze bespuiting worden tevens aanwezige aardappeltopluizen (toprol) en larven van de coloradokever bestreden.
- Controleer alle gewassen op aanwezigheid van bladluizen en voer zo nodig een bestrijding uit met **0,45 l Batavia** (knolselderij, koolraap en wortelen), **0,375 l Sivanto Prime + 1 l Robbester** (erwten en veld- en tuinbonen), **0,5 kg Pirimor** (graszaad, maanzaad, koolraap, wortelen, erwten en veld- en tuinbonen) of **140 gram Teppeki** (granen).
- Met de toenemende kans op neerslag neemt ook de kans op phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in uien toe. Zorg dat uw gewas tijdig beschermd is, in sommige regio's wordt al valse meeldauw in plantuien aangetroffen!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.