

Voorkom toprol in aardappelen

Ter voorkoming van toprol in aardappelen blijft het advies om voor half juni een bestrijding tegen de aardappeltopluis uit te voeren. Het best kan gebruik worden gemaakt van **0,25 kg Gazelle** of **0,5 l Sivanto Prime + 1 l olie**. Met Gazelle en Sivanto Prime worden tevens de larven van de coloradokever bestreden.

Op steeds meer percelen aardappelen treffen we momenteel op de onderste bladeren wegedoorn- en vuilboomluizen aan. Om deze te bestrijden kan het nodig zijn om meer water te gebruiken om voldoende diep in het gewas te komen. Bij heel zware gewassen wordt ook wel geadviseerd een uitvloeier zoals **0,25 l WellPower** toe te voegen.

Bescherm ook zaaiuien tegen valse meeldauw

Zoals in de vorige Theunisse TIP al genoemd werd treffen we hier en daar al wat valse meeldauw in tweedejaars plantuien aan. Reden om een strak spuitschema aan te houden en om ook van start te gaan met de ziektebestrijding in de zaaiuien, mocht dit nog niet het geval zijn.

Het aantal toegelaten middelen voor de bescherming tegen valse meeldauw in zaaiuien is nog beperkter dan dat dit voor de plantuien het geval is. Een spuitschema waarbij voldoende afgewisseld wordt tussen de toegelaten middelen is daardoor niet mogelijk. Ons spuitschema voor de zaaiuien in 2025 ziet er als volgt uit:

1. **0,2 l Orondis + 1 l Amistar + 0,25 l WellPower/ 1 l Robbester**
2. **0,2 l Zorvec Epicaltrin + 0,4 l Kenbyo FI + 0,25 l WellPower/ 1 l Robbester**
3. **0,2 l Zorvec Epicaltrin + 0,4 l Kenbyo FI + 0,25 l WellPower/ 1 l Robbester**
4. **1,25 l Fandango***
5. **0,2 l Orondis + 1 l Amistar + 0,25 l WellPower/ 1 l Robbester**
6. **0,2 l Zorvec Epicaltrin + 0,4 l Kenbyo FI + 0,25 l WellPower/ 1 l Robbester**
7. **1,25 l Fandango***
8. **0,2 l Orondis + 1 l Amistar + 0,25 l WellPower/ 1 l Robbester**

*) Fandango pas inzetten vanaf begin bolvorming van de uien. Fandango kan op een mals gewas weleens scherp werken daarom niet mengen met een uitvloeier! Mengen met een bladmeststof is wel mogelijk.

De toegelaten middelen hebben geen van allen een curatieve (genezende) werking zodat een infectie met valse meeldauw niet gestopt kan worden zoals met phytophthora in aardappelen wel het geval is. Hierdoor is het nog belangrijker om een gesloten spuitschema aan te houden. Bij extreem hoge ziektedruk of bij aanwezigheid van valse meeldauw wordt geadviseerd om de spuitintervallen te verkorten en/of **3 l Vitalosol Gold** toe te voegen aan de ziektebestrijding.

Wanneer starten met bescherming tegen bladschimmels in bieten

Deze week kwam het IRS met de mededeling dat op enkele gesloten bietenpercelen de BAS-app aangaf dat er gedurende twee opeenvolgende dagen hoge infectiewaarden (>6) voor cercospora waren gemeten. Dit betekent dat er rekening houdend met de incubatietijd van cercospora over 10 tot 18 dagen mogelijk de eerste vlekjes te vinden zouden zijn op deze percelen.

Door gebruik te maken van de BAS-app van Cosun kunnen in een vroeg stadium al de eerste maatregelen tegen cercospora genomen worden. Hoe te handelen nadat u zo vroeg een waarschuwing van de BAS-app hebt ontvangen:

- Op percelen met een laag infectierisico (hoog cijfer voor bladgezondheid, ruime vruchtwisseling en geen bieten naast bieten) kan overwogen worden om **3 l Vitalosol Gold** in te zetten om de weerstand en plantvitaliteit te verhogen.
- Op percelen met een hoog infectierisico is het advies voor de eerste bespuiting **1,2 l Propulse**. Voer de bespuiting uit op een mals gewas en verbeter de opname door het toevoegen van een uitvloeier zoals bv **0,25 l WellPower** of **0,4 l Promotor**. De werking kan nog versterkt worden door het toevoegen van **3 l Vitalosol Gold**.

Voer in ieder geval een bespuiting tegen bladschimmels uit wanneer de eerste vlekjes zichtbaar worden (wekelijkse controle na sluiten van het gewas). Houdt er rekening mee dat de meeste gewassen dit jaar duidelijk vroeger zijn in ontwikkeling.

Korte TIPs

- Ook in zaaiuien worden nu regelmatig larven van trips aangetroffen. Zet bij aanwezigheid hiervan op een goed groeiend gewas **0,75 l Batavia + 1 – 2 l Robbester/ 0,25 – 0,5 l WellPower** in. Herhaal deze bespuiting na ca. 14 dagen (zie TIP#12).
- Save the date! Woensdag 2 juli hebben wij onze proefveldmiddag. Uitnodiging volgt binnenkort.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.