

Waarschuwing voor bietenmot in suikerbieten

Momenteel worden we verrast door aantasting van de bietenmot in suikerbieten. De rupsen van de bietenmot vreten ongeveer gedurende een maand in het hart van de biet eer ze gaan verpoppen. De hartbladeren worden dan zwart en er zijn vaak spinseldraden en uitwerpselen te zien. Als gevolg van de aantasting kan er hergroei optreden, wat ten koste gaat van het suikergehalte. Bij een latere secundaire aantasting door bacteriën, kunnen de bieten vanuit de kop gaan rotten.

Een bestrijding is niet eenvoudig!

Voor de bestrijding van de rups is in Nederland nog geen schadedrempel vastgesteld. De schadedrempel in Frankrijk ligt op 10% aangetaste planten. Bekijk daarom bij aantasting van de bietenmot verspreid over het perceel tenminste 60 planten. Bekijk het hart van de biet en probeer als het hart zwart is onderscheid te maken tussen hartrot door boriumgebrek, valse meeldauw of bietenmot. Een bestrijding is niet eenvoudig, alleen tijdens het uitkomen van de eieren kunnen de zeer jonge larven bestreden worden met **125 ml Coragen**. Gebruik minimaal 400 l water en voeg **0,25 l WellPower** toe om voldoende indringing in het gewas te krijgen. De bespuiting kan gecombineerd uitgevoerd worden met een bladschimmelbestrijding. Coragen mag maximaal twee keer per jaar toegepast worden met een interval van 14 dagen. De veiligheidsstermijn bedraagt 28 dagen.

Loofdoding van aardappelen

Hoewel erin een eerdere TIP al aandacht voor is geweest willen wij, nu de meeste consumptieaardappelen doodgespoten gaan worden, nog even stilstaan bij onze advisering voor het doodspuiten.

Wij adviseren hiervoor de volgende werkwijze:

1. Start met **0,8 l Quickdown + 2 l Robbester/olie** om het gewas open te spuiten.
2. Na 5-7 dagen **1 l Spotlight Plus** of op rassen met "taai" loof klappen en 1-2 dagen later **1 l Spotlight Plus**.
3. Indien nodig na 5 dagen een derde bespuiting uitvoeren met **0,8 l Quickdown + 2 l Robbester/olie** of **1 l Affinity Plus**.
4. Doorgaans zijn de aardappelen twee weken na de laatste bespuiting voldoende afgehard en laten gemakkelijk los.

Aandachtspunten bij de loofdoding:

- Licht bevordert de werking, voer de bespuiting liefst op een 'dauwopdrogend' gewas uit.
- Zorg met veel water (400-500 liter) en een goede spuittechniek voor een betere indringing in het gewas.
- De looflengte na klappen dient ca. 10-15 cm te zijn; verwijder zoveel mogelijk blad.
- Bij klappen en spuiten tegelijk kan 50% van de dosering aangehouden worden.
- Toevoeging van 1-2 l Robbester/olie aan Spotlight Plus/ Affinity Plus versterkt de onkruid- en aanvangswerking.
- Reinig de spuitapparatuur zorgvuldig na toepassing met een specifiek tankreinigingsmiddel zoals Primaclean.

In doodgespoten pootaardappelen zien we regelmatig hergroei optreden. Zolang er nog groen blad aanwezig is blijft er kans op aantasting door phytophthora en virus!

Bewaarziekten in pootaardappelen

Bewaarziekten bij pootaardappelen zoals fusarium en phoma zijn te beperken door een behandeling met **150 ml Potazil 100 SL*** per 1000 kg pootaardappelen uit te voeren bij het inschuren. Deze behandeling heeft ook werking op zilverschorft.

Extra werking op zilverschorft kan verkregen worden door na het sorteren, tot 4 weken vóór het poten, de pootaardappelen te behandelen met **0,3 l Flim*** per 1000 kg pootaardappelen. Flim heeft ook een sterke werking op rhizoctonia, fusarium en phoma.

*) Behandelde pootaardappelen niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

Aandachtspunten:

Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een rollenbaan en schijfvernevelaar

Voorkom rooibeschadigingen en zorg voor een goede wondheling

Droog de aardappelen zo snel mogelijk en voorkom condensvorming om zilverschorft te voorkomen

Gebruik voldoende spuitvloeistof voor een optimale knolbedekking

Zorg dat uw bewaarkisten gereinigd zijn

Korte TIPs

- Voor seizoen 2025-2026 beschikken wij over de wintergerstrassen Joyau en Zorica. Beide rassen zijn tolerant voor het gerstevergelingsvirus. Wintergerst is een goed alternatief voor tarwe op tarwe, zeker nu er geen mogelijkheid meer bestaat om zaaizaad te ontsmetten met Latitude XL. Informeer ons tijdig wanneer u voorkeur hebt voor specifieke wintergerst ras.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.