

Meerwaarde van bodemherbiciden in bieten

Een bodemherbicide aan de basis in bieten geeft meer ruimte om een na-opkomst onkruidbestrijding wat uit te stellen wanneer bijvoorbeeld de weersomstandigheden een bespuiting niet toelaten. Daarnaast maakt het onkruid gevoeliger voor een na-opkomstbespuiting en is het voor de bestrijding van kamille, hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid eigenlijk onmisbaar, zeker nu we dit jaar niet meer over Safari en Safari DuoActive kunnen beschikken.

Wanneer kamille wordt verwacht:

- **2 – 3 l Goltix SC/ Bettix SC**

Wanneer o.a. hondspeterselie, bingelkruid, varkensgras of kleeftkruid wordt verwacht:

- **50 – 100 ml Centium 360 CS**
(Op zandgrond of wanneer sprake is van een slechte structuur, de laagste dosering aanhouden i.v.m. kans op schade).

Voor de meest brede werking kan gekozen worden voor:

- **2 l Goltix SC/ Bettix SC + 50 – 100 ml Centium 360 CS***
- **2,5 l Kezuro + 50 – 70 ml Centium 360 CS***
(Sterkste combinatie, ook op duivenkervel; *) Laagste dosering op zandgrond aanhouden).

Bodemherbiciden in diverse gewassen:

Na de oproep in de vorige Theunisse TIP om schoon van start te gaan vragen we nu aandacht voor het tijdig inzetten van een bodemherbicide als basis voor een geslaagde onkruidbestrijding. Door de bodemherbiciden direct na zaai te spuiten bestaat er minder kans op schade en zal het de effectiviteit ten goede komen.

Tuinbonen

- **1,8 kg Novitron Dam tec** (Novitron Dam tec is een combinatieproduct van clomazone en challenge)

Erwten en kapucijners

- **0,15 – 0,2 l Centium 360 CS + 0,75 – 1,5 l Challenge**

Spinazie

- **0,1 – 0,15 l Centium 360 CS + 1 – 1,5 kg/l Goltix** (Op zandgrond maximaal 1 kg/l Goltix gebruiken)

Blauwmaanzaad

- **0,1 – 0,15 l Centium 360 CS** (Centium kan na veel neerslag weleens plantwegval veroorzaken)

Vlas

- **1 l Callisto** (De toelating van Callisto in vlas en blauwmaanzaad loopt tot 31-12-2025)

Dek (uien- en) aardappelafvalhopen direct of uiterlijk 1 maart af!

Het ministerie van LVN heeft strengere voorschriften afgekondigd gericht op het tegengaan van het ontstaan en ontwikkelen van nieuwe phytophthora-haarden. Bij aardappelafvalhopen geldt de afdekplicht **vanaf 1 april**, ongeacht zichtbaarheid van aardappelstengels of -bladeren. Voor aardappelopslag is de norm nu maximaal één plant per vierkante meter en geldt voortaan dat er uiterlijk 15 juni aan moet worden voldaan. De NAK zal ook dit teeltseizoen intensief controleren. Bij gebleken nalatigheid krijgt de teler de kans op herstel. De termijn hiervoor is ingekort van drie dagen naar één dag.

Korte TIPs

- In december 2024 is er een nieuwe doppenlijst verschenen. De meest actuele DRT- en DRD- lijsten zijn tegenwoordig niet meer op de Helpdesk Water maar op de [site van het Informatiepunt Leefomgeving](https://www.iplo.nl) te vinden (www.IPLO.nl).
- Het geeft geen 100% garantie maar om meer zekerheid te krijgen of u schade door ritnaalden kunt verwachten is het advies halve aardappelen ca. 10 cm diep in de grond te graven om deze na 1–2 weken te controleren op aanwezigheid van deze steeds meer voorkomende belager.
- De kans op schade door muizen in bieten wordt groter bij een grofkluitig zaaibed, vroege zaai en een trage kieming. Voorkom muizenschade door voldoende diep te zaaien en door een aantal dagen voor het zaaien alternatief voer langs de perceelranden aan te bieden.
- Uiterlijk 15 maart 2025 dient u uw bemestingsplan klaar te hebben. In het plan moet de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van mest worden beschreven.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.