

Groeiregulatie wintergranen

De wintergranen ontwikkelen zich goed nadat ze de eerste stikstofgift hebben ontvangen. Wanneer het graan goed aan de groei is en het stadium “einde uitstoeling – eerste knoop” heeft bereikt kan de eerste groeiregulatie uitgevoerd worden.

Wintertarwe

- **0,5 l CCC + 0,4 kg Prodax.**

Na 7 – 10 dagen de tweede groeiregulatie uitvoeren met:

- **0,5 l CCC + 0,3 kg Prodax** (Op extra stevige rassen kan volstaan worden met alleen **0,75 l CCC**)

Wanneer ten tijde van het uitvoeren van de groeiregulatie gele roest aangetroffen wordt, is het advies deze bespuiting te combineren met een ziektebestrijding met **0,5 – 0,75 l Retengo**, de zgn. T0 bespuiting.

Combineer de groeiregulatie liever niet met de onkruidbestrijding. Vindt er toch een gecombineerde bespuiting plaats, kies dan voor **1 l CCC** als groeiregulator. Voer de bespuiting(en) bij voorkeur enkele dagen vóór het ‘sleepslangen’ uit of wacht anders tot het graan weer voldoende schoon is.

Wintergerst

- **0,6 - 0,75 kg Prodax + 0,5 - 1 l Powerleaf Mangaan Plus/ Mantrac**

Voer na 7 - 10 dagen een tweede bespuiting uit met:

- **0,4 kg Prodax + 0,5 l Mangaan Plus/ Mantrac** (Kan i.c.m. ziektebestrijding op T1 met **1 – 1,25 l Balaya + 1,5 l Stavento**)

De werking van Prodax is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden. Om klontering van Prodax te voorkomen is het advies om het middel voorzichtig in de tank te doseren!

Onkruidbestrijding grasland

Onkruidbestrijding in grasland is snel rendabel omdat het beter ruwvoer geeft. Voer de bestrijding bij voorkeur uit vóór het onkruid in bloei komt. Een breed werkend advies is:

- Nieuw grasland: **1 l Tapir + 1 – 1,5 l Jepolinex Pro**
- Bestaand grasland: **1,25 l Tapir + 1 – 1,5 l Cirran**

Wanneer ook paarse dovenetel of fluitenkruid bestreden moet worden is het advies **0,5 – 0,75 l Tapir + 0,75 l Renitar** (+ 1 – 1,5 l Cirran*/ Jepolinex Pro bij aanwezigheid van distels of weegbree). *) Cirran is niet toegelaten in eerstejaars grasland.

Bij aanwezigheid van veel zuring kan beter gewacht worden tot de zuring flink ontwikkeld is en de temperatuur >15°C is. Het advies is dan **1,5 l Tapir + 0,3 l Starane Top/ Pixxaro** (Pixxaro wanneer paarse dovenetel aanwezig is; let op driftreductie).

Aaltjes en fusarium in zaaiuien

In Theunisse TIP 1 hebben we aandacht besteedt aan de bestrijding van ritnaalden en uien- en bonenvlieg d.m.v. het toedienen van 12 kg Belem 0,8 MG tijdens het zaaien.

Het toedienen van **20 kg NEMguard** in de rij tijdens het zaaien beperkt de schade door aaltjes en heeft een nevenwerking tegen bonen- en uienvlieg. NEMguard heeft voor een goede werking tot 6 weken na zaai minimaal 80 mm vocht nodig. Valt dit niet van nature dan zal er beregend moeten worden.

Een alternatief, bv wanneer er geen granulaatstrooier beschikbaar is of als aanvulling op een aaltjesbestrijding, is het inwerken vóór zaai van **10 l BioMyPro-NemC** gevolgd door een gewasbehandeling bij 15-20 cm lengte. Voor deze toepassing de spuit tank vooraf grondig reinigen met het meegeleverd zuur.

Het effect van deze middelen wordt versterkt door tijdens het zaaien een startfosfaat zoals **30 l Powerstart Flores (0-30-5)** als rijenbehandeling op het zaad te spuiten. Voldoende direct beschikbaar fosfaat in de bodem zorgt tevens voor een vlotte beginontwikkeling, meer planten en een hogere opbrengst.

Bij een lichte besmetting met fusarium kan naast een ruime vruchtwisseling, de keuze voor een tolerant ras, het voorzichtig zijn met beregenen, een grondbehandeling met **0,6 l Rudis (+ 5 l Serenade)** voor zaai de infectiedruk verlagen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.