

Start tijdig met LDS in suikerbieten

De meeste bieten zijn gezaaid, ze staan echter nog lang niet allemaal boven. Omdat bij een onregelmatige opkomst de kleinste bieten bepalend zijn voor de hoogte van de dosering is het advies om tijdig te starten met de LDS bespuitingen, in ieder geval op zo klein mogelijk onkruid nog zonder echte blaadjes.

De standaarddosering voor het LDS is:

- **0,5 – 0,75 l Corzal SE/ Astrix EC + 0,5 l Ethofol 200 + 0,5 l Goltix SC/ Bettix SC + 0,5 - 1 l Robbester/ Olie**
- **0,5 - 1 l Betanal Tandem + 0,5 l Goltix SC/ Bettix SC + 0,5 - 1 l Robbester/ Olie**

Wanneer de onkruiden niet meer in het kiembladstadium staan, kan vanaf het gestrekte kiembladstadium van de bieten de laagste dosering verhoogd worden met 50% en vanaf het tweebladstadium met 100%.

Voer een onkruidbestrijding alleen uit op een gezond gewas en wanneer geen nachtvorst wordt verwacht. Voer de bespuiting 's avonds of 's ochtends vroeg uit wanneer de RV zo hoog mogelijk is. Onder de huidige droge omstandigheden kan met name de bestrijding van melden een probleem vormen. Kies in dit geval voor de hogere dosering Astrix EC/ Corzal SE of Betanal Tandem en houdt de hoogste dosering Robbester/ olie aan. Houdt korte intervallen van 5 – 7 dagen aan.

Wanneer alle bieten boven staan kan aan de LDS **150 ml Venzar 500 SC** toegevoegd worden (op grond met minder dan 2,5% humus en zandgrond niet eerder dan begin tweebladstadium). Wanneer nog geen Venzar ingezet kan worden is het advies om bij aanwezigheid van hondspeterselie 0,5 l Goltix SC/ Bettix SC te vervangen door **0,65 – 0,75 l Kezuro**.

Wees alert op muizenschade in bieten

Regelmatig treffen we muizenschade aan op percelen waar door droogte het zaad niet (snel genoeg) gekiemd is. Alternatief voer wegleggen is hier vaak al te laat, dit dient liefst 1 – 2 weken vóór het zaaien gedaan te worden zodat de muizen hun gang hiernaartoe tijdig weten te vinden. Controleer de voerplaatsen regelmatig tot dat alle zaad gekiemd is.

Groeiregulatie en T0 bespuiting in vroege wintertarwe

De meeste wintertarwe staat er momenteel gezond bij. Sporadisch wordt er wat gele roest aangetroffen wat de komende periode wel kan uitbreiden. Voor vroeg gezaaide tarwe die nu aan de tweede groeiregulatie toe is kan overwogen worden om deze bespuiting te combineren met een T0 ziektebestrijding met **0,35 – 0,5 l Retengo**. Hierdoor kan de T1 ziektebestrijding met **1,2 l Queen** rustig uitgesteld worden tot eind april, zodat het gat tussen T1 en T2 beperkt kan worden tot ca. 3 weken.

Retengo is niet alleen een fungicide maar heeft ook plantversterkende eigenschappen. Zo zorgt het voor minder gewasstress, een betere stikstofopname en meer groen blad.

Onder de huidige weersomstandigheden kan een groeiregulator stevig aanpakken. Het advies is dan om bij een erg droge grond en hogere dagtemperaturen de dosering van Prodax te verlagen naar 0,3 kg per hectare. Ook wanneer in combinatie met een herbicide wordt gespoten dient de dosering Prodax verlaagd te worden met 0,1 kg/ha.

Onkruidbestrijding in zaaiuien

Vergeet niet om tot enkele dagen voor opkomst aanwezig onkruid af te branden met glyfosaat zoals bv **2 l Azural** of **1,5 l Roundup Dynamic**. Gelijktijdig met deze bespuiting kunnen ook de bodemherbiciden aangevuld worden tot **1,5 – 2 l Stomp 400 SC**.

Wanneer u geen kans hebt gezien de zaaiuien kort voor opkomst af te branden kan als noodmaatregel nog tot in het kramstadium een contactbespuiting uitgevoerd worden op een aantal kleine onkruiden. Gebruik hiervoor **0,15 – 0,2 l Basagran + 75 ml Starane Top**. Voorwaarden voor een zo veilig mogelijke toepassing zijn: gebruik veel water en een grove druppel; spuit op een droge grond (afgehard gewas); spuit nooit kort voor veel neerslag en niet in het vlaggetjesstadium.

Voorkómen van onkruid blijft de beste tactiek voor een geslaagde onkruidbestrijding in uien. Vergeet daarom in het kramstadium ook niet om de bodemherbiciden aan te vullen. Het advies hiervoor is **0,2 l AZ 500**. Voor een goede werking van AZ 500 is minimaal 10-15 mm neerslag nodig, zet het daarom zo vroeg mogelijk in. Dit kan ook veilig gebeuren onder droge omstandigheden en wanneer de opkomst tweewassig is. Wacht met de toediening van **0,5 – 1 l Wing P** tot de uien volledig in het kramstadium staan, er géén sprake is van nachtvorst en er de eerste dagen na de bespuiting géén grote hoeveelheden neerslag worden verwacht. Bij twijfel kan Wing P altijd vervangen worden door **0,5 – 0,75 l Stomp 400 SC**. Pas op met het 'stapelen' van Stomp 400 SC en Wing P wanneer er geen neerslag valt of er niet beregend wordt.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.