

Bladluizen in bieten

In de suikerbieten treffen we de eerste bladluizen aan, vnl. zwarte bonenluis. Controleer vanaf opkomst de bietenplantjes wekelijks op aanwezigheid van luizen en voer een bestrijding uit bij overschrijding van de onderstaande schadedrempels:

- Op 30 – 50% van de planten is kolonievorming van zwarte bonenluis te vinden.
- ≥ 2 groene perzikbladluizen per 10 planten.

Voor de bestrijding kan gebruik worden gemaakt van **140 gram Teppeki WG** (max. 1 keer; tot het 10 bladstadium en uiterlijk tot 1 juni) of **0,4 kg Pirimor**. Pirimor is alleen voldoende effectief voor de bestrijding van de zwarte bonenluis.

Voer de bespuiting, eventueel in combinatie met de LDS, 's avonds uit bij een hogere RV en gebruik 300 – 400 l water.

Moment voor T1 ziektebestrijding in wintertarwe nadert

We treffen momenteel in de wintertarwe voornamelijk septoria (bladvlekkenziekte) en in sommige rassen (vnl. Chevignon) wat meeldauw aan. De vroegste percelen wintertarwe naderen het moment voor de T1 ziektebestrijding, de zgn. Koningsdagbespuiting. Dit moment (GS32) is te herkennen aan het verschijnen van de 2^e knoop, het 3^e blad is dan geheel zichtbaar en de gewas lengte is 25-30 cm.

Ons advies voor de T1 ziektebestrijding is:

- **1,2 l Queen***
- **1,25 l Balaya of 1 l Balaya + 1,5 l Stavento**

*) Queen heeft de sterkste werking op septoria en een goede preventieve werking tegen roest. Wanneer gele- of bruine roest in het gewas aanwezig is adviseren wij **0,5 l Retengo** aan 1,2 l Queen toe te voegen vanwege de mindere curatieve werking hierop. Voor een goede opname van Queen is een hoge RV op het moment van spuiten wenselijk.

Wanneer er veel meeldauw in het gewas aanwezig is kan hiervoor het best **0,5 l Nissodium** ingezet worden, dit kan goed in combinatie met de 2^e groeiregulatie. Wanneer er geen bestrijding van meeldauw noodzakelijk is wordt de 2^e groeiregulatie vaak uitgesteld tot het moment van de T1 ziektebestrijding zodat deze gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Op veel percelen volstaat dit jaar voor de 2^e groeiregulatie **0,75 l CCC**, voor de zwaardere gewassen is het advies **0,5 l CCC + 0,2 - 0,3 kg Prodx**.

Onkruidbestrijding na opkomst in erwten

De bodemherbiciden laten dit jaar duidelijk een steekje vallen. Zo ook in conservenerwten, start tijdig met de bestrijding van kiemend onkruid. Dit kan in elk stadium van het gewas met:

- **0,5 l Basagran* + 0,25 l Webo Wett/ 0,3 l Promotor** (Bij het verschijnen van nieuw onkruid de bespuiting herhalen (interval min. 7 dagen))

Vanaf ca. 5-10 cm gewas lengte kan de dosering verhoogd worden naar:

- **1 - 1,5 l Basagran* + 0,25 l Webo Wett/ 0,3 l Promotor**
- **1 l Basagran* + 0,5 l Oblix 500 SC** (Oblix 500 SC versterkt de werking op o.a. melde en zwaluwtong)

*) Basagran bij dagtemperaturen $>20^{\circ}\text{C}$ pas tegen de avond spuiten. Gebruik niet meer dan 2 l Basagran per teelt.

Onkruidbestrijding en groeiregulatie in zomertarwe

Wacht met de onkruidbestrijding in zomertarwe tot de meeste onkruiden gekiemd zijn. Een geschikt moment is vaak einde uitstoeling – begin schieten van de tarwe. De onkruidbestrijding wordt in dit stadium vaak gecombineerd met de groeiregulatie. Een éénmalige inzet van **0,5 l CCC + 0,2 - 0,3 kg Prodx** of 2 keer **0,6 l CCC** geeft in zomertarwe meestal voldoende halmversteving.

Mogelijke adviezen voor de onkruidbestrijding in zomertarwe:

- **130 gram Capri Twin + 0,35 l Pixxaro* + 1 l Robbester** (brede werking, ook tegen windhalm, jonge duist en ereprijs)
- **1 l Tapir + 0,35 l Pixxaro*** (sterke combinatie, ook op aardappelopslag en als basis voor distelbestrijding)
- **70 gram Biathlon 4D + 0,35 l Pixxaro***

Voeg aan bovenstaande combinaties **1,5 – 2 l MCPA** toe wanneer ook distels of uitstaande melden bestreden moeten worden.

*) Pixxaro dient met een DRT95 gespoten te worden, het kan eventueel vervangen worden door **0,3 l Starane Top + 1 l MCPA**.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.