

Inzameling resten en vervallen gewasbeschermingsmiddelen 2026

Ook in 2026 kunnen gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen via de STORL-campagne eenvoudig en verantwoord resten en oude, vervallen middelen laten afvoeren. De inzameling tot 50 kg/l is gratis.

Meer weten? Alle details en voorwaarden over de inzamelingen in 2026 vindt u op www.storl.nl.

Wacht niet tot het laatste moment, de aanmelding sluit op 31 maart 2026.

Nieuw etiket voor Stomp 400 SC vraagt nodige aandacht

Belangrijk om te weten is dat vanaf 1 maart 2026 het W.25 etiket niet meer geldig is. Vanaf deze datum dienen alle Stomp 400 SC voorraden voorzien te zijn van een W.27 etiket. Wanneer U nog Stomp 400 SC op voorraad heeft in de GBM-opslag dient U het nieuwe W.27 etiket hieraan toe te voegen. [Klik hier voor het W.27 etiket van Stomp 400 SC.](#)

Het nieuwe etiket bevat een aantal aanpassingen. Het middel mag bijvoorbeeld niet meer in grondwaterbeschermingsgebieden gebruikt worden. Ook is in nagenoeg alle teelten DRT95 een standaard vereiste geworden en mag bij afwezigheid van een bufferstrook langs oppervlaktewater in cichorei en uien, het middel maximaal 1 keer per 12 maanden toegepast te worden.

Lees het etiket daarom goed voor het gebruik!

Knolbehandeling van pootaardappelen

Binnenkort worden op veel bedrijven de pootaardappelen weer afgeleverd. Bij aanwezigheid van rhizoctonia (lakschurft) op de poters is een knolbehandeling voor of tijdens het poten altijd rendabel.

Bij poot- of tafelaardappelen, waar ook de schilkwaliteit belangrijk is, verdient tevens de bestrijding van zilverschurft aandacht. Tegen zwarte spikkel heeft een veurbehandeling met **3 l Amistar** tijdens het poten de voorkeur.

Behandel alleen fysiologisch jong pootgoed en zorg voor een snelle droging na behandeling. Voor een goede bedekking is het gebruik van een rollenbaan met bijv. een Mafex-schijfvernevelaar aan te bevelen.

MIDDEL	DOSERING	RHIZOCTONIA	ZILVERSCHURFT	ZWARTE SPIKKEL	FUSARIUM	PHOMA
FLIM*	0,3 l/ton	+++	++(+)	-	+++	+++
MAXIM 100 FS	0,25 l/ton	++(+)	+++	+	++	++
ALLSTAR	0,2 l/ton	+++	+	-	-	-
MONARCH	0,2 l/ton	+++	-	-	-	-

*) Flim toepassen minimaal 4 weken voor het poten op kiemvrij pootgoed. Behandelde aardappelen mogen niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden bestemd.

Onkruidbestrijding en startmeststof in tweedejaars plantuien

Op vers geploegd land zijn de eerste plantuien de grond ingegaan. Plantuien hebben vaak in de eerste groeifase te maken met koude en moeilijke groeiomstandigheden waardoor het moeilijk is voor de plant om fosfaat op te nemen. Zorg daarom juist in de beginfase voor gemakkelijk opneembaar fosfaat bij de plant. Gebruik hiervoor tijdens het planten een startfosfaat zoals:

- **30 kg DCM Startec – Agri**
- **30 – 45 kg DCM Vivisol – Agri** (Wanneer PW-waarde >35, bacteriën maken het bodemfosfaat beschikbaar voor de plant)
- **30 l Powerstart Flores** (Voor toepassing op het zaad of wanneer geen granulaatstrooier aanwezig is)

Zorg na het planten voor een robuuste dosering bodemherbiciden. Ons advies is om bij voorkeur op een bezakte grond een bespuiting uit te voeren met **1 l Wing P + 0,2 l AZ 500 + 1 l Stomp 400 SC**. Leg direct na het planten al wel de spuïtsporen aan.

Vergeet ook in de winterplantuien niet om de bodemherbiciden aan te vullen zodra de grond weer berijdbaar is. Dit kan op schone grond met bv. **1 – 2 l Wing P + 0,5 – 1 l Stomp**. Bij aanwezigheid van klein onkruid kan hier nog **0,25 l Challenge + 1 l Boxer** aan toegevoegd worden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.