

Start tijdig met viruspreventie in poot aardappelen

Start vanaf 30 % opkomst van de poot aardappelen met de inzet van virusolie + pyrethroïden en houdt korte intervallen aan. Het is in deze snelle loofgroeiperiode beter om iedere drie dagen te spuiten met 3 l virusolie dan om de vijf dagen met 5 - 7 l virusolie. Door deze strategie blijft de nieuwe groei beschermd.

Voeg bij een grote luizendruk regelmatig een luizendoder toe zoals:

- **0,25 kg Gazelle/ Antilop** (max. 1 toepassing vóór het sluiten van het gewas of 2 toepassingen na sluiten van het gewas)
- **0,5 l Sivanto Prime + olie** (max. 1 toepassing vanaf begin bodembedekking)

Het etiket van Gazelle en Antilop is dit jaar behoorlijk aangescherpt. Zo is het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden verboden; is het aantal toepassingen aangepast; is inzet pas vanaf 50% grondbedekking toegestaan en is de driftreductie aangepast naar een DRT 90 + 3 m teeltvrij, DRT 95 + 2,5 m teeltvrij of DRT 97,5 + 1,75 m teeltvrij.

T2 ziektebestrijding wintertarwe

Wanneer het vlagblad van de tarwe volledig uit is, is het tijd voor de T2 bespuiting. Ons advies hiervoor is **1, 5 l Revytrex**.

Vanwege de langdurige droogte in april zijn er nog, veelal laat gezaaide, percelen wintertarwe waar geen T1 ziektebestrijding is uitgevoerd. Gezien het veranderende weerbeeld neemt de kans op aantasting door septoria en roest weer toe. Op deze percelen adviseren wij daarom alsnog een ziektebestrijding uit te voeren. Overleg hierover met uw adviseur.

De T2 bespuiting kan goed gecombineerd worden met **20 l Powerleaf Stikstof Plus** (zie TIP#9) en met een bladluisbestrijding met bv **140 gram Teppeki** of een pyrethroïde zoals **0,2 l Sumicidin Super** of **0,42 l Decis Protech**. Pyrethroïden hebben ook een nevenwerking op de larven van het graanhaantje.

Onkruidbestrijding stamslabonen

Een tijdig klaar gelegd zaaibed voor de teelt van stamslabonen vermindert de kans op aantasting door de bonenvlieg. Daarnaast kan er op deze manier al veel onkruid gekiemd zijn voordat er gezaaid gaat worden. Het bovenstaande onkruid dient vóór zaai afgebrand te worden met o.a. **2 - 3 l Azural** of **1,4 - 3,2 l Roundup Dynamic**. Bij gebruik van spuitwater met hoge pH het water aanzuren met **Uptake pH** of **5 - 10 kg zwavelzure ammoniak**. Ook het toevoegen van **0,25 l Wellpower** verbeterd de opname.

Spuit bij voorkeur direct na zaai, in ieder geval ruim vóór opkomst, met **0,15 - 0,2 l Centium 360 CS + 1,5 - 2 l Fresco**. Op zandgrond met weinig organische stof de lage dosering aanhouden.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Wanneer het 1^e pijpje in de zaaiuien is verschenen en een lengte van 3 cm heeft bereikt, kunnen we op een droge grond een contactbespuiting uitvoeren op ontsnapt klein onkruid. Wanneer er geen sprake is van droge grond kunnen in dit stadium in ieder geval de bodemherbiciden veilig aangevuld worden met **1 - 1,5 l Wing P** en kan **AZ500** aangevuld worden tot **0,2 l/ha**.

Mogelijke combinaties voor een contactbespuiting wanneer het eerste pijpje minimaal 3 cm lang is:

- **0,25 - 0,5 kg Lentagran + 0,15 - 0,25 l Basagran + 0,075 - 0,12 l Starane Top + 0,5 l Stomp/ Wing P**
(Sterk op o.a. klein kruiskruid, veelknopigen en hondspeterselie).
- **0,25 - 0,5 l Basagran + 0,075 - 0,12 l Starane Top + 0,5 l Stomp/ Wing P**
(Sterk op o.a. veelknopigen en hondspeterselie).
- **0,25 - 0,5 kg Lentagran + 0,075 - 0,12 l Starane Top + 0,5 - 1 l Boxer**
(Sterk op o.a. melden en duivenkervel).

AANBEVELINGEN:

- Gebruik een grove dop en spuit met minimaal 400 l water tijdens windstil weer op een afgehard gewas (droge grond).
- Gebruik bij een lengte van het 1^e pijpje van 3 cm de laagste dosering, vanaf 6 cm lengte kan de hoogste dosering gekozen worden. Indien nodig de bespuiting na 5 - 7 dagen herhalen met eventueel een aangepaste dosering.
- In zaaisjalotten (niet in zaaiuien!) kan wanneer het 1^e pijpje > 5 cm is 0,1 - 0,25 l Challenge toegevoegd worden (max 4 keer).
- Wing P alleen toevoegen wanneer sprake is van een goed afgehard gewas, de toevoeging van Stomp is het veiligst.
- Basagran niet mengen met Boxer vanwege grote kans op een gewasreactie.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.