

Start tijdig met de bestrijding van trips in uien

In tweedejaars plantuien, en soms zelfs al in vroege zaaiuien, treffen we regelmatig larven van trips aan. Voor een vroege teelt is dit niet zo zorgelijk, voor late plantuien die uit mogen groeien en zaaiuien adviseren wij om het gewas regelmatig te controleren op de aanwezigheid van trips. Vooral onder droge weersomstandigheden en hoge temperaturen kan de ontwikkeling van trips razendsnel gaan. Hopelijk kan de voorspelde regen en verlaging van temperatuur de ontwikkeling van trips remmen.

In plantuien kan bij aanwezigheid van trips éénmaal in drie jaar **0,13 kg Minecto One + 1 l Robbester** ingezet worden. Minecto One bevat de werkzame stof cyantraniliprole die we ook kennen uit in uien niet meer toegelaten Benevia. Met de toegelaten dosering Minecto One geven we duidelijk minder werkzame stof dan dat we dat met Benevia gaven. De effectiviteit en werkingsduur zal dus ook minder zijn is de verwachting.

In zowel plantuien als zaaiuien kan trips ook bestreden worden met **0,2 l Tracer + 2 l Lokfructose + 0,25 l Certain**. Gebruik 400 - 500 l water per hectare en voer de bespuiting 's avonds laat of 's morgens vroeg uit. De werkingsduur van Tracer bedraagt 7 tot 10 dagen. Tracer mag 4 keer ingezet worden.

Door het telkens toevoegen van **1,5 - 2 kg Biolit** (silicium) aan de ziektebestrijding wordt de ui sterker en weerbaarder. Silicium zorgt voor stevige celwanden waardoor een plant beter omgaat met droogte en minder aantrekkelijk wordt voor insecten zoals trips. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur.

Bodemherbiciden in bieten aanvullen voor sluiten van het gewas

De vroege bieten krijgen al snel het veld dicht. Zorg daarom dat, voor er te veel parapluwerking ontstaat, aan de LDS onkruidbestrijding **0,3 - 0,45 l Frontier** (tot maximaal 0,9 liter/ha) of **0,3 - 0,6 l Tanaris** (tot maximaal 1,5 l/ha) toegevoegd wordt. Wanneer de bieten schoon staan kan Frontier of Tanaris ook zonder een LDS onkruidbestrijding gespoten worden.

Akkerdistels en akkermelkdistels kunnen tot het sluiten van de bieten nog bestreden worden met **1,2 l Lontrel/ Vivendi + 1 l olie**. Voer de bestrijding uit wanneer sprake is van groeizaam weer en een hoge luchtvochtigheid. Lontrel en Vivendi hebben ook een behoorlijke bodemwerking tegen breedbladige onkruiden.

Ziektebestrijding in zaaiuien

Zoals we in Theunisse TIP#12 al genoemd hebben treffen we regelmatig valse meeldauw aan in tweedejaars plantuien. Reden om een strak spuitschema aan te houden en om ook van start te gaan met de ziektebestrijding in de vroege zaaiuien wanneer deze 3 - 4 pijpjes hebben ontwikkeld. Als bijlage treft u het Theunisse schema voor de ziektebestrijding in zaaiuien 2026 aan.

Let op dat Fandango pas ingezet kan worden vanaf begin bolvorming van de uien. Fandango kan op een mals gewas weleens scherp werken daarom niet mengen met een uitvloeier! Menging met een bladmeststof is wel mogelijk.

Bij aanwezigheid van valse meeldauw in of nabij het perceel, kunnen de fungicidebespuitingen ondersteund worden door toevoeging van **3 l Vitalosol Gold** of **2 l Frutogard**. Vitalosol Gold is een bladmeststof die mangaan, koper en zwavel bevat. Vitalosol Gold goed schudden voor gebruik en als eerste in de tank doen. Frutogard maximaal 4 keer inzetten.

Bladluizen in suikerbieten

Door het warme weer zien we een toename van de bladluizen in diverse gewassen, zo ook in de suikerbieten. Wanneer meer dan 2 groene luizen per 10 planten of wanneer op minstens de helft van de planten zwarte bonenluizen aangetroffen worden, is het advies een bestrijding uit te voeren. Een bestrijding hiertegen kan uitgevoerd worden met:

- **0,25 l Sivanto Prime + 0,25 l Wellpower** (éénmalig toepassen; heeft ook nevenwerking tegen bietenvlieg)
 - **140 gram Teppeki/ Afinto + 0,25 l Wellpower** (éénmalig toepassen tot het 10 bladstadium; heeft meer duurwerking)
- Voer de bespuiting uit tijdens een hoge RV en gebruik minimaal 300 - 400 l water per ha. Blijf de bieten regelmatig controleren.

Korte TIPS

- In verschillende gewassen komen momenteel bladluizen voor. Bestrijding kan met **0,25 l Sivanto Prime + 0,25 l Wellpower** (knolselderij, koolraap en wortelen), **0,375 l Sivanto Prime + 0,25 l Wellpower** (erwten en veld- en tuinbonen), **0,5 kg Pirimor** (graszaad, maanzaad, koolraap, wortelen, erwten en veld- en tuinbonen) of **140 gram Teppeki** (granen). De aflevertermijn van Pirimor loopt tot 15-9-2026, de opgebruiktermijn tot 31-12-2026. Bestel tijdig!
- De door u gereserveerde Herold zal vóór 10 juni (einde aflevertermijn) door ons afgeleverd en gefactureerd worden.
- Lees in de onlangs verschenen Bayer Akkerbouwkoerier meer over de **Propulse Cashback** actie.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.