

## Loofdoding in (poot)aardappelen

De eerste (poot)aardappelen worden momenteel al doodgespoten of geklapt. Voor de loofdoding hebben wij het volgende advies:

1. Start met **0,8 l Quickdown + 2 l Robbester/olie** om het gewas open te spuiten.
2. Na 5-7 dagen **1 l Spotlight Plus\*** of op rassen met "taai" loof klappen en 1-2 dagen later **1 l Spotlight Plus\***.
3. Indien nodig na 5 dagen een derde bespuiting uitvoeren met **0,8 l Quickdown + 2 l Robbester/olie** of **1 l Affinity Plus\***.
4. Doorgaans zijn de aardappelen twee weken na de laatste bespuiting voldoende afgehard en laten gemakkelijk los.

Aandachtspunten bij de loofdoding:

- Licht bevordert de werking, voer de bespuiting liefst op een 'dauwopdrogend' gewas uit.
- Zorg met veel water (400-500 liter) en een goede spuittechniek voor een betere indringing in het gewas.
- De looflengte na klappen dient ca. 10-15 cm te zijn; verwijder zoveel mogelijk blad.
- Bij klappen en spuiten tegelijk kan 50% van de dosering aangehouden worden.
- Toevoeging van 1-2 l Robbester/olie aan Spotlight Plus/ Affinity Plus versterkt de onkruid- en aanvangswerking.
- Reinig de spuitapparatuur zorgvuldig na toepassing met een specifiek tankreinigingsmiddel zoals Primaclean.
- Zolang er nog groen blad aanwezig is blijft er kans op aantasting door phytophthora en virus!

\*) Naast Spotlight Plus en Affinity Plus beschikken we dit jaar ook over Wopro Loofdood. Al deze middelen zijn identiek aan elkaar.

## Kiemremming met MH in aardappelen

Door een op het juiste tijdstip en op de juiste manier uitgevoerde behandeling met MH op het veld, blijven de aardappelen in de bewaring wel 2 – 3 maanden langer in rust. Belangrijke nevenwerkingen zijn de terugdringing van opslag in volgteelten tot wel 75% en het verkleinen van de kans op doorwas, ook wel redenen om aardappelen die niet de bewaring in gaan te behandelen.

Spuit **5 kg Royal MH** of **11 l Crown MH/ Itcan SL 270 MH** wanneer het bladapparaat over de top van de groei is (na de bloei) en wanneer min. 80% van de knollen > 30-35 mm zijn. Bij voorkeur 4 - 5 weken voor de verwachte loofdoding toepassen.

Aandachtspunten bij de toepassing van MH:

- Spuit op een vitaal en mals gewas dat niet in stress verkeerd.
- Spuit in de ochtend of avond, wanneer de temperatuur in ieder geval lager is dan 25°C.
- Er dient minimaal 10 - 12 uur droog weer te volgen op de bespuiting.
- Gebruik 400 – 500 l water en voeg geen uitvloeier toe.
- Het ras Innovator vertoont vaak onverwacht snel een sterke slijtage na een periode van hitte. Wees hierop alert en voer direct een bespuiting uit als de eerste slijtageverschijnselen zichtbaar zijn.

## Ziektebestrijding knolselderij

Bij opspattend water of bladnatperioden van 12 uur of langer (dawnachten) is er kans op infectie door bladvlekkenziekte. Ga voor de ziektebestrijding van start met **0,4 l Score** of **1 l Amistar Top** wanneer het vermoeden bestaat dat er al een infectie plaats heeft gevonden. Beschikt u nog over Luna Sensation, kies dan voor **0,5 l Luna Sensation**. De opgebruiktermijn hiervan loopt tot 30 juli 2026!

## Korte TIPS

- Voor de ziektebestrijding in uien is inmiddels Orondis VIP beschikbaar. Orondis VIP bevat naast oxathiapiproline (Zorvec) de curatieve component metalaxyl-M (Ridomil). Er mag 2 keer **0,5 l Orondis VIP** gespoten worden met een interval van 7 dagen.
- Laat vanwege de vorming van nieuw (= onbeschermd) blad het interval tussen de 1<sup>e</sup> en de 2<sup>e</sup> bladschimmelziekte bestrijding in de bieten niet groter worden dan 2,5 – 3 weken. Nadat voor de 1<sup>e</sup> bespuiting 1,2 l Propulse is ingezet is het advies voor de 2<sup>e</sup> bespuiting **1 l Diadem + 0,25 l Wellpower (+ 3 l Vitalosol Gold)**.
- De laatste tijd zien we in verschillende bietenpercelen (veel) schieters ontstaan. Verwijder de schieters voordat ze in bloei komen en duizenden zaden vormen die jaren kiemkrachtig blijven. Zeker schieters van de Conviso Smart bieten dienen tijdig verwijderd te worden omdat zij in andere teelten nauwelijks te bestrijden zijn.
- Onze groenbemesterfolder is bijgevoegd. Deze folder ondersteunt u in het maken van een goede groenbemesterkeuze.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.