

Bewaarziekten in pootaardappelen

Tijdens het rooien van de aardappelen, en zeker wanneer dit onder droge omstandigheden gebeurt, kunnen beschadigingen aan de knollen ontstaan. Juist deze wondjes vormen een invalspoort voor bewaarziekten zoals Fusarium en Phoma. Deze invalspoorten dienen daarom zo snel mogelijk te worden beschermd. Het advies is om tijdens het inschuren een behandeling met **150 ml Potazil 100 SL** per 1000 kg pootaardappelen uit te voeren. Deze behandeling heeft ook werking op zilverschurft.

Pootaardappelen die behandeld zijn met Potazil 100 SL mogen niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemd worden. Wanneer er o.a. om deze reden besloten wordt om de poters niet te behandelen of pas te behandelen na het sorteren, kan er bij het inschuren gekozen worden voor een knolbehandeling met biostimulanten, n.l. **60 ml Cuprum + 12,5 ml Argentum** per 1000 kg pootaardappelen. Deze behandeling geeft geen directe bestrijding van bewaarziekten maar maakt de knollen weerbaarder hiertegen.

Er zijn ook positieve praktijkervaringen opgedaan door tijdens het loofklappen een mix van **200 ml Cuprum + 100 ml Argentum** per hectare te spuiten op het geklapte loof om infecties te voorkomen en de plantafweer ten opzichte van Phoma te vergroten.

Aandachtspunten:

- Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een rollenbaan en schijfvernevelaar(s)
- Vul eerst water in de tank en voeg daarna pas Cuprum + Argentum toe
- Vermijd het rooien van (poot)aardappelen bij product-/grondtemperatuur van 18 graden of hoger
- Voorkom rooibeschattingen en zorg voor een goede wondheling
- Droog de aardappelen zo snel mogelijk en voorkom condensvorming om zilverschurft te voorkomen
- Gebruik minimaal 1 liter spuitvloeistof per ton voor een optimale knolbedekking
- Zorg dat uw bewaarkisten gereinigd zijn

Onkruidbestrijding in grasland

De nazomer en het najaar zijn ideale momenten om ridderzuring, paardenbloemen en distels aan te pakken. Profiteer van de neerwaartse sapstroom in wortelonkruiden voor een langere duurwerking. Wacht voor de beste opname van de herbiciden tenminste 2 - 3 weken na een snede zodat onkruiden zich (weer) voldoende hebben ontwikkeld (ridderzuring in het volle rozetstadium/ begin schieten).

Wanneer de bestrijding speciaal gericht is op ridderzuring is het sterkste advies:

- **1,5 l Tapir + 0,3 l Starane Top/ 0,3 l Pixxaro**

Wanneer naast ridderzuring ook weegbree, distels of melden bestreden moeten worden:

- **1,5 l Tapir + 1,5 l Jepolinex Pro**

Gras-klover weiden

In gras-klover weiden bestaat ook de mogelijkheid om ridderzuring te bestrijden in de nazomer of het najaar. Witte klover wordt gespaard of zal herstellen maar rode klover zal zich slecht of niet herstellen, zeker niet in 1^e jaars grasland.

Advies op voldoende ontwikkelde ridderzuring:

- **30 gram Harmony SX** i.v.m. groeiremming van het gras alleen na de laatste snede toepassen. Harmony SX bestrijdt naast ridderzuring o.a. ook boterbloemen.
- **85 -125 gram ProClova + 0,125-0,25 l Robbester** De laagste dosering aanhouden op 1^e jaars grasland. Toepassen wanneer sprake is van een hoge luchtvochtigheid.

Korte TIPS

- Donderdag 27 augustus 2026 organiseert het UIKC de landelijke Uiendag op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. Het thema dit jaar is "Alle zeilen bij". Meer informatie over deze dag treft u aan op www.uiendag.nl.
- U hebt een geldige spuitlicentie op uw eigen naam nodig wanneer u professionele gewasbeschermingsmiddelen aankoopt, ze in opslag hebt en ze gebruikt. Alleen wanneer het gaat om niet-professionele middelen (zie hiervoor het etiket) heeft u geen spuitlicentie nodig. In alle andere gevallen wel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.