

Bladschimmels in bieten

Mede door de warme en droge zomer zijn de bladschimmels in de suikerbieten veelal redelijk tot goed onder controle. Begin september is op de meeste percelen die in oktober of later gerooid gaan worden nog een bestrijding tegen bladschimmels uitgevoerd. Of er begin oktober dan nog een (laatste) bestrijding uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de rooidatum, 4 weken voor het rooien heeft een bespuiting geen zin meer. Dit geldt ook wanneer sprake is van een zware cercospora aantasting, beter is het dan de rooidatum naar voren te halen. Na half oktober is een bestrijding meestal niet meer rendabel.

Een bestrijding kan uitgevoerd worden met o.a. **1,2 l Propulse** (geen v.t.), **1 l Diadem** (v.t. 28 dgn.), **1,25 l Belanty + 0,5 l Tern** (v.t. 28 dgn.), **1 l Spyrale** of **0,25 l Narita XL + 0,5 l Tern** (v.t. 28 dgn.) Wissel af tussen de middelen om resistentie te voorkomen.

Loofdoding aardappelen

De komende weken zullen de meeste consumptieaardappelen doodgespoten worden. Daarom hier nogmaals een keer aandacht voor de loofdoding van aardappelen. De keuze voor één of meerdere bespuitingen is afhankelijk van de vitaliteit van het gewas.

Wanneer alle loof en stengels goed geraakt kunnen worden:

- **1 l Spotlight Plus/ Affinity Plus + 1 - 2 l Robbester/olie + 0,4 l Levanta/ 0,5 l Ranman Top/ 0,3 l Canvas**

Op (gedeeltelijk) vitalere gewassen met meer blad:

- **0,8 l Quickdown + 2 - 3 l Robbester/olie + 0,4 l Levanta/ 0,5 l Ranman Top/ 0,3 l Canvas**
- Na 6 - 7 dagen **1 l Spotlight Plus*/Affinity Plus* + 1 - 2 l Robbester/olie**.
- Op groeikrachtige rassen zoals bv Melody kan het nodig zijn na ca. 5 dagen een derde bespuiting uit te voeren.

Aandachtspunten bij de loofdoding:

- Licht bevordert de werking, voer de bespuiting liefst in de ochtend op een 'dauwopdrogend' gewas uit.
- Zorg met veel water (400-600 liter) en een goede spuittechniek voor een betere indringing in het gewas.
- Doorgaans zijn de aardappelen twee weken na de laatste bespuiting voldoende afgehard en laten gemakkelijk los.
- Reinig de spuitapparatuur zorgvuldig na toepassing met een specifiek tankreinigingsmiddel zoals Primaclean.
- Zolang er nog groen blad aanwezig is blijft er kans op aantasting door phytophthora en virus!

*) Spotlight Plus en Affinity Plus zijn vergelijkbare middelen, zij mogen beiden slechts één keer per teelt toegepast worden.

Wintertarwe of wintergerst

Wanneer er wintergraan gezaaid gaat worden kan er gekozen worden voor wintergerst of wintertarwe of beiden natuurlijk. De teelt van wintergerst geeft een vroeg vrijkomende stoppel en het geeft meer risico- en arbeidsspreiding. Wanneer wintergerst na tarwe geteeld wordt is het advies om in ieder geval te ploegen omdat er anders problemen met tarweopslag ontstaan. Zaai wintergerst van eind september tot eind oktober. Vroege zaai geeft meer kans op aantasting door het gerstevergelingsvirus.

Voor wintergerst adviseren wij de volgende gerstevergelingsvirus-tolerante rassen (advies blijft om luizen te bestrijden):

LG Zorica Voergerst met een zeer hoge opbrengst en goede ziekteresistenties

KWS Joyau Voegrijp en hoge opbrengst, een goede stro-stevigheid en goede ziekteresistenties uitgezonderd meeldauw

Voor de rassenkeuze van wintertarwe hebben wij onze handige brochure "Wintertarwe rassenadvies 2026 - 2027" als bijlage toegevoegd. Tevens wijzen wij u op de door CSAR gepubliceerde [Aanbevelende rassenlijst voor wintertarwe 2027](#).

Wacht niet te lang met het doorgeven van uw bestelling, zeker niet wanneer u een specifiek ras wilt hebben.

Korte TIPs

- In wortelen zien we een toename van meeldauw. De meest curatieve werking tegen meeldauw geven enkele bespuitingen met **0,4 l Rudis WE** of **1 l Dagonis SC**. De werking tegen meeldauw wordt ondersteund door hier een zwavelmeststof aan toe te voegen, zoals bv **3 l Vitalosol gold/ 2 - 3 kg Sulfo 80 WG**. Ondanks dat Sulfo 80 WG gemakkelijk oplost in de tank is het advies om na gebruik de tank en leidingen goed na te spoelen om eventueel bezinsel te verwijderen.
- Dit jaar was het in de knolselderij opvallend rustig met de aanwezigheid van wantsen. De laatste weken treffen we echter op steeds meer percelen wantsen aan. Voer bij aanwezigheid van wantsen een bestrijding uit met **0,5 l Decis Protech**.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.