

Onkruidbestrijding en mangaanbemesting in wintergerst

De meeste wintergerst is in het najaar gespoten met een bodemherbicide. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen aanwezige grassen (behalve straatgras) nog bestreden worden met:

- **1 - 1,2 l Puma Extra + 1 l Robbester**

Voer een grassenbestrijding altijd uit onder groeizame omstandigheden, dwz een RV>60% en een temperatuur > 10°C. Houdt een interval van min. 5 – 7 dagen aan met een onkruidbestrijding, een breed werkende combinatie hiervoor is:

- **0,5 – 0,75 l Tapir + 0,75 l Renitar (DRT95) + (1 l Fox 480 SC)**

Voeg Fox 480 SC toe wanneer ook ereprijs bestreden moet worden. Fox 480 SC niet mengen met Produx of Trimaxx! Wintergerst is gevoelig voor mangaangebrek, vooral op losse grond en grond met een hoge pH. Voeg daarom einde uitstoeling en begin strekking **0,5 – 1 l Mangaan Plus/ Mantrac** toe aan de onkruidbestrijding of groeiregulatie.

Groeiregulatie wintergranen

Het wintergraan ontwikkelt zich snel momenteel, veel percelen zijn al toe aan de eerste groeiregulatie. Een vroege toepassing aan het einde van de uitstoeling, het moment wanneer de tarwe de lengte in gaat, heeft de voorkeur omdat deze toepassing de meeste versteviging geeft. Een latere toepassing geeft vooral verkorting van de halmen.

Wintertarwe

Einde uitstoeling – 1^e knoop zichtbaar (GS 30 – 31):

- **0,4 kg Produx* + 0,5 l CCC**

10 -14 dgn later - 2^e knoop zichtbaar (GS 32):

- **0,3 kg Produx* + 0,5 l CCC**
- **0,75 l CCC** (op extra stevige rassen)

Wanneer ten tijde van het uitvoeren van de groeiregulatie op gele roest aangetroffen wordt, is het advies deze bespuiting te combineren met een ziektebestrijding met **0,5 – 0,75 l Retengo**, de zgn. T0 bespuiting.

Wintergerst

Einde uitstoeling – 1^e knoop zichtbaar (GS 30 – 31):

- **0,75 kg Produx* + 0,5 - 1 l Powerleaf Mangaan Plus/ Mantrac**

10 – 14 dgn later - 2^e knoop zichtbaar (GS 32):

- **0,4 kg Produx* + 0,5 l Mangaan Plus/ Mantrac**

*) Een aparte bespuiting heeft de voorkeur maar wanneer de groeiregulatie gecombineerd wordt met een onkruidbestrijding is het advies de dosering Produx te verlagen met 0,1 l/ha. Dit advies geldt ook wanneer bij temperaturen >20°C gespoten wordt. De werking van Produx is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden. Om klontering van Produx te voorkomen is het advies om het middel voorzichtig in bewegend water in de tank te doseren!

Korte TIPs

- Bij aardappelaafvalhopen geldt de afdekplicht vanaf 1 april, ongeacht zichtbaarheid van aardappelstengels of -bladeren. Voor aardappelopslag op het veld is de norm maximaal één plant per vierkante meter en geldt dat er uiterlijk 15 juni aan moet worden voldaan. Uienafvalhopen dienen uiterlijk 15 april afgedekt te zijn. Er zal weer intensief gecontroleerd worden is aangekondigd. **Afvalhopen zijn de grootste infectiebron van phytophthora en valse meeldauw!**
- Wanneer u met ons de afspraak heeft dat wij de monitoring van de uien- en bonenvlieg op uw uienperceel gaan verzorgen vragen wij om ons op de hoogte te brengen wanneer de uien gezaaid worden. Wij zullen dan de lokvallen plaatsen.
- Het geeft geen 100% garantie maar om meer zekerheid te krijgen of u schade door ritnaalden kunt verwachten is het advies halve aardappelen ca. 10 cm diep in de grond te graven om deze na 1–2 weken te controleren op aanwezigheid van deze steeds meer voorkomende belager.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.