

Onkruidbestrijding in grasland

Onkruidbestrijding in grasland is snel rendabel omdat het beter ruwvoer geeft. Voer de bestrijding bij voorkeur uit vóór het onkruid in bloei komt. Wij hebben hiervoor de volgende adviezen.

Nieuw grasland:

- **1 l Tapir + 1 l Jepolinex Pro**
- **0,5 – 0,75 l Tapir + 0,75 l Renitar (+ 1 l Jepolinex Pro)** (Sterk op o.a. paarse dovenetel; Jepolinex Pro toevoegen bij aanwezigheid van uitstaande melde, distels en weegbree)

Bestaand grasland:

- **1,25 – 1,5 l Tapir + 1 – 1,5 l Cirran**
- **0,5 – 0,75 l Tapir + 0,75 l Renitar (+ 1 – 1,5 l Cirran/ Jepolinex)** (sterk op o.a. paarse dovenetel; Jepolinex Pro toevoegen bij aanwezigheid van uitstaande melde, distels en weegbree)

Bestaand grasland met veel ridderszuring:

- **1,5 l Tapir + 0,3 l Starane Top/ Pixxaro*** (wacht met de bestrijding van zuring tot deze flink ontwikkeld is (ca. 3 weken na een maaibeurt) en de dagtemperatuur >15°C is; *) Kies voor Pixxaro wanneer paarse dovenetel aanwezig is)

Onkruidbestrijding in gras - klaverweiden:

- **85 gram Proclova* + 0,15 l Robbester** (advies voor nieuw ingezaaid grasland)
- **125 gram Proclova* + 0,25 l Robbester** (op bestaand grasland)
- **1 – 2 l Basagran + 1 l Robbester**

*) Aandachtspunten bij het gebruik van Proclova:

- Toepassen bij temperaturen tussen 10- en 25°C en bij een RV>60%
- Wacht tot de klaver drie samengestelde bladeren heeft
- Niet toepassen in het jaar van inzaai van rode klaver (rode klaver herstelt zich lastiger dan witte klaver)
- Toepassen op goed groeiend onkruid, minimaal 10 dagen na een maaibeurt
- Minder gevoelig zijn: muur groter dan 3-4 cm, paarse dovenetel, varkensgras en zwaluwtong
- Ongevoelig zijn: grote brandnetel, distels en jacobskruid

Aaltjes en fusarium in zaaiuien

Het toedienen van **20 kg NEMguard DE** in de rij tijdens het zaaien beperkt de schade door aaltjes en heeft net als **12 kg Belem** in de rij op het zaad een nevenwerking op de bonen- en uienvlieg (zie Theunisse TIP#2). NEMguard DE heeft voor een goede werking tot 6 weken na zaai minimaal 80 mm vocht nodig. Valt dit niet van nature dan zal er beregend moeten worden.

Een alternatief, bv wanneer er geen granulaatstrooier beschikbaar is of als aanvulling op een aaltjesbestrijding, is het inwerken vóór zaai van **10 l BioMyPro-NemC** gevolgd door een gewasbehandeling bij 15-20 cm lengte. Voor deze toepassing de spuitank vooraf grondig reinigen met het meegeleverd zuur.

Het effect van deze middelen wordt versterkt door tijdens het zaaien een startfosfaat zoals **30 l Powerstart Flores (0-30-5)** als rijenbehandeling op het zaad te spuiten. Voldoende direct beschikbaar fosfaat in de bodem zorgt tevens voor een vlotte beginontwikkeling, meer planten en een hogere opbrengst.

Bij een lichte besmetting met fusarium kan naast een ruime vruchtwisseling, de keuze voor een tolerant ras, het voorzichtig zijn met beregenen, een grondbehandeling met **0,6 l Rudis (+ 5 l Serenade)** voor zaai de infectiedruk verlagen.

Ziektebestrijding in wintergerst

In wintergerst is het advies om tussen het zichtbaar worden van de 1e en 2e knoop de T1 ziektebestrijding uit te voeren. Ons advies hiervoor is **1 – 1,25 l Balaya + 1,5 l Stavento**. Deze bespuiting kan eventueel gecombineerd uitgevoerd worden met de 2e groeiregulatie met **0,4 kg Prodax** en/of een mangaanvoeding met **0,5 – 1 Mangaan Plus/ Mantrac**.

Korte TIPs

- De kans op schade door muizen in bieten wordt groter bij een grofkluitig zaaibed, vroege zaai en een trage kieming. Voorkom muizenschade door voldoende diep te zaaien en door vanaf een aantal dagen voor het zaaien alternatief voer langs de perceelranden aan te bieden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.