

## T1 ziektebestrijding in wintertarwe

In de wintertarwe treffen we momenteel vooral septoria (bladvlekkenziekte) aan. Sporadisch vinden we ook gele roest en meeldauw. Veel percelen wintertarwe naderen het moment voor de T1 ziektebestrijding. Dit moment (GS32) is te herkennen aan het verschijnen van de 2<sup>e</sup> knoop, het 3<sup>e</sup> blad van boven is dan geheel zichtbaar en de gewaslengte is 25-30 cm.

Ons advies voor de T1 ziektebestrijding is:

- **1,2 l Queen\***
- **1,25 l Balaya**

\*) Queen heeft de sterkste werking op septoria en een goede preventieve werking tegen roest. Wanneer gele- of bruine roest in het gewas aanwezig is adviseren wij **0,5 l Retengo** aan 1,2 l Queen toe te voegen vanwege de mindere curatieve werking hierop of te kiezen voor 1,25 l Balaya. Voor een goede opname van Queen is een hoge RV op het moment van spuiten wenselijk.

Voer de T1 bespuiting direct uit wanneer er aantasting van gele- of bruine roest gevonden wordt. Wat betreft septoria kan de T1 bespuiting onder de huidige droge weersomstandigheden wat uitgesteld worden zodat de interval tot de T2 bespuiting (vlagblad uit) wat kleiner wordt. Queen en Balaya hebben een werkingsduur van ca 3 weken.

Wanneer de 2<sup>e</sup> groeiregulatie nog niet is uitgevoerd kan deze gecombineerd worden met de T1 ziektebestrijding. Voor extra stevige rassen kan voor de 2<sup>e</sup> groeiregulatie volstaan worden met **0,75 l CCC**, voor de minder stevige rassen of wanneer sprake is van rijkere grond is het advies **0,5 l CCC + 0,2 - 0,3 kg Prodax**.

## Onkruidbestrijding in zaaiuien rondom de opkomst

Vergeet niet om tot enkele dagen voor opkomst aanwezig onkruid af te branden met glyfosaat zoals bv **2 l Azural** of **1,5 l Roundup Dynamic**. Gelijktijdig met deze bespuiting kan ook de bodemherbicide aangevuld worden tot **1,5 - 2 l Stomp 400 SC**.

### Noodmaatregel:

Wanneer u geen kans hebt gezien de zaaiuien kort voor opkomst af te branden kan bij aanwezigheid van klein onkruid nog tot in het kramstadium een contactbespuiting uitgevoerd worden. Gebruik hiervoor **0,15 l Basagran + 75 ml Starane Top**. Voorwaarden voor een zo veilig mogelijke toepassing zijn: gebruik veel water en een grove druppel; spuit op een droge grond (afgehard gewas); spuit nooit kort voor veel neerslag en niet wanneer de uien in het vlaggetjesstadium staan.

Voorkómen van onkruid blijft de beste tactiek voor een geslaagde onkruidbestrijding in uien. Vergeet daarom in het kramstadium ook niet om de bodemherbiciden aan te vullen. Het advies hiervoor is **0,2 l AZ 500 + 0,5 - 1 l Wing P**.

Voor een goede werking van AZ 500 is minimaal 10-15 mm neerslag nodig, zet het daarom zo vroeg mogelijk in. Dit kan ook veilig gebeuren onder droge omstandigheden en wanneer de opkomst tweewassig is. Wacht met de toediening van 0,5 - 1 l Wing P tot de uien volledig in het kramstadium staan en er géén sprake is van nachtvorst en er de eerste dagen na de bespuiting géén grote hoeveelheden neerslag worden verwacht. Bij twijfel kan Wing P altijd vervangen worden door **0,5 - 0,75 l Stomp 400 SC**. Pas op met het 'stapelen' van Stomp 400 SC en Wing P wanneer er geen neerslag valt of er niet berekend wordt.

## Onkruidbestrijding en groeiregulatie in zomertarwe

Wacht met de onkruidbestrijding in zomertarwe tot de meeste onkruiden gekiemd zijn. Een geschikt moment is vaak einde uitstoeling - begin schieten van de tarwe. De onkruidbestrijding wordt in dit stadium vaak gecombineerd met de groeiregulatie. Een éénmalige inzet van **1 l CCC** of **0,5 l CCC + 0,2 - 0,3 kg Prodax** geeft in zomertarwe meestal voldoende halmversteving.

Mogelijke adviezen voor de onkruidbestrijding in zomertarwe:

- **130 gram Capri Twin + 0,35 l Pixxaro + 1 l Robbester** (brede werking, ook tegen windhalm, jonge duist en ereprijs; Pixxaro dient met een DRT95 gespoten te worden, anders vervangen door **0,3 l Starane Top + 1 l MCPA**).
- **1 l Tapir + 0,35 l Pixxaro** (voeg bij aanwezigheid van aardappelopslag van 10 - 20 cm hoog **0,3 l Starane Top** toe).
- **1 l Tapir + 1,5 - 2 l MCPA** (sterk op distels en uitstaande melde; voeg bij aanwezigheid van aardappelopslag van 10 - 20 cm hoog **0,45 l Starane Top** toe).

## Korte TIPS

- De beste strategie om gladvingergras of knolcyperus te bestrijden in maïs waarin geen vanggewas gezaaid gaat worden is om te starten na zaai met **4 l Wing P** of **1,4 l Frontier**. In de latere na-opkomstbespuiting kan Frontier dan achterwege gelaten worden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.