

Start tijdig met ziektebestrijding in 2^e jaars plantuien

In winteruien is de eerste aantasting van valse meeldauw al aangetroffen. Een richtlijn om te bepalen wanneer gestart moet worden met de ziektebestrijding in uien is wanneer de uien 4 pijpen hebben en wanneer de omstandigheden voor het ontstaan voor valse meeldauw aanwezig zijn. Raadpleeg hiervoor het beste een B.O.S..

Een goede bestrijding begint met het tijdig opruimen of afdekken van afvalhopen, dit is wettelijk verplicht vanaf 15 april!

Ga voor de eerste twee bespuitingen van de ziektebestrijding van start met:

- **2 l Frutogard + 0,25 l WellPower** (max. 3 keer; interval 7 dagen)

Wanneer er sprake is van een hoge ziektedruk of wanneer er valse meeldauw in de omgeving aangetroffen wordt kan beter gekozen worden voor **0,2 l Orondis + 1 l Amistar + 0,25 l WellPower** (eventueel aanvullen met 2 l Frutogard of 3 l Vitalosol Gold). Zie de bijlage voor een spuitschema dat als leidraad gehanteerd kan worden voor de ziektebestrijding in tweedejaars plantuien.

In plantuien wordt bij de ziektebestrijding vaak enkele keren extra mangaanvoeding mee gespoten, dit kan o.a. in de vorm van **3 l Vitalosol Gold** of **0,5 l Powerleaf Mangaan Plus** of **5 l Powerleaf Mn- Mg nitraat** (niet samen met Frutogard).

Onkruidbeheersing in aardappelen zonder Sencor

Het grootste gemis van het wegvallen van metribuzin (o.a. Sencor en Citation) in de aardappelen zal zijn dat er minder mogelijkheden voor de onkruidbestrijding na opkomst zijn. In pootaardappelen is er zelfs geen enkele mogelijkheid meer na opkomst. Dit is zeker reden om in te zetten op een stevige mix van bodemherbiciden aan de basis voor opkomst van de aardappelen. Veel gebruikte combinaties hiervoor zijn o.a.:

- **2 - 2,5 l Proman + 0,15 l Centium 360 CS* + 1,5 l Challenge/ 2 - 3 l Boxer** (*Kies voor de Planetproof teelt en wanneer veel meldingen verwacht worden voor de toevoeging van Challenge. Boxer versterkt de werking op zwarte nachtschade.*)
- **2 l Proman + 3 l Boxer + 1,5 l Challenge** (*Zacht voor het gewas, daarom ook zeer geschikt voor pootaardappelen.*)
- **0,2 l Centium 360 CS* + 2 l Gofor + (1,5 l Proman/ 2 l Boxer)** (*Sterke mix wanneer doornappel wordt verwacht. Gofor heeft een opgebruiktermijn tot 31-8-2026.*)

Aandachtspunten:

- Spuit bodemherbiciden, bij voorkeur op vochtige of bezakte grond, met minimaal 400 – 600 l water.
- Challenge, Gofor en Centium ruim vóór opkomst (4-5 dagen) spuiten.
- Proman + Boxer is de enige combinatie die tot aan de opkomst veilig gespoten kan worden.
- Challenge en Gofor kunnen grote schade aanrichten aan fruit en jonge bietenplantjes, voorkom drift en thermiek hiernaartoe!

*) Centium 360 CS heeft geen toelating in pootaardappelen.

Tot aan de opkomst kunnen aanwezige zaadonkruiden (geen grassen) nog bestreden worden met **0,4 l Quickdown + 1 l olie**.

Onkruidbestrijding in knolselderij

In knolselderij kan vanaf 10 – 14 dagen na het planten op schone grond een onkruidbestrijding uitgevoerd worden met bv **0,15 – 0,25 l Centium 360 CS + 1,5 – 2 l/kg Goltix** of **1 l Challenge + 1,5 - 2 l Stomp 400 SC + (0,15 l AZ 500)**

Nadien kan nieuw onkruid nog bestreden worden met bv **1 l Corzal SE + 0,5 l Challenge** of **0,5 l/kg Goltix + 1 - 1,5 l Boxer**.

Centium 360 CS, Goltix WG, Goltix SC, Stomp 400 SC en Challenge mogen slechts één keer ingezet worden. Overleg met uw adviseur over alternatieven. Er mag 3 keer 1 – 3 l Boxer (max. 5 l/ha) en 3 keer 2 – 2,25 l Corzal SE (max. 6 l/ha) gebruikt worden. Dit jaar is er een KUG-toelating voor **4 x 0,25 – 0,5 l Venzar 500 SC** (max. 1 l/ha) afgegeven in knolselderij. Wij hebben nog geen praktijkervaring met de inzet van Venzar 500 SC in knolselderij. Hiervoor zullen dit jaar proeven aangelegd worden.

Wees alert op bladluizen in suikerbieten

Wees alert op de aanwezigheid van bladluizen in suikerbieten. Wanneer het zaaizaad behandeld is met Buteo Start zijn de bieten tot het 4-bladstadium beschermt tegen bladluizen. In andere gevallen is het advies om bij aanwezigheid van meer dan 2 groene perzikbladluizen per 10 planten een bestrijding uit te voeren met **0,25 l Sivanto Prime**. Voeg **0,25 l Wellpower** toe of combineer de bespuiting met de LDS onkruidbestrijding. Wanneer alleen kolonievormende zwarte bonenluizen aangetroffen worden, wordt het beste bestrijdingsresultaat meestal bereikt met **0,4 kg Pirimor**. Pirimor werkt onvoldoende op groene perzikbladluizen. Voer de bestrijding tegen bladluizen bij voorkeur 's avonds uit wanneer sprake is van een hoge RV en gebruik min. 300 l water.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.