

Onkruidbestrijding in zaaiuien

Vul bij voorkeur op vochtige grond de bodemherbiciden aan zodra zaaiuien in het kramstadium staan met **0,2 l AZ 500** (éénmalig) + **0,5 - 1 l Wing P**.

Wanneer sprake is van een grijze grond kan als noodmaatregel in het kramstadium klein onkruid bestreden worden met bv **0,2 l Basagran + 0,2 l Bromotril + 75 ml Starane Top**. Gebruik veel water en een grove druppel en houdt enkele dagen verschil met het spuiten van bodemherbiciden. I.v.m. extra gevoeligheid van de uien, geen contactmiddelen spuiten tijdens het vlaggetjesstadium.

O.a. veelknopigen, paarse dovenetel, muur en herik (geen klein kruiskruid en kamille) kunnen, door om de 5 – 7 dagen te spuiten met **0,5 – 0,75 l Intruder (Chloor IPC)**, redelijk tot goed onder controle worden gehouden. Het beste effect krijgt men door te spuiten onder koude omstandigheden (temp.<17°C, dus bij voorkeur 's avonds) en op een vochtige grond. Voeg aan deze bespuitingen afwisselend **0,25 kg Pyramin DF** of **0,5 l Stomp 400 SC** toe. Mits toegepast met een grove druppel en veel water kunnen deze bespuitingen ook tijdens het vlaggetjesstadium toegepast worden.

Onkruidbestrijding na opkomst in cichorei

Probeer in cichorei altijd voor opkomst het onkruid af te branden met **1,5 l Dragoon/ Reglone Bold**. Wanneer de omgeving het toelaat kan rond de opkomst ook heel goed met korte intervallen (5 dagen) **0,5 l Intruder** gespoten worden. Ga in cichorei in ieder geval tijdig van start met de onkruidbestrijding en herhaal indien nodig.

Vanaf 90% opkomst:

5-7 gram Safari + 40 ml AZ500 + 0,5 l Intruder + 0,5 l Legurame + (0,25 l Kerb Flo).

(In Benulite en Barite kan de dosering Safari verhoogt worden naar 10-15 gr. of vervangen worden door 35 gr. Titus)

Vanaf 1 echt blaadje:

10-15 gram Safari + 60 ml AZ500 + 0,5 l Intruder* + 0,5 l Legurame + (0,25 l Kerb Flo).

(In Benulite en Barite kan de dosering Safari verhoogt worden naar 20 gr. of vervangen worden door 35 gr. Titus)

Aandachtspunten:

AZ 500 na opkomst langzaam opbouwen, bijvoorbeeld 40 – 60 – 100 ml per keer (in totaal maximaal 0,2 l AZ500).

Legurame maximaal twee keer toepassen met een interval van 14 dagen. Legurame is niet meer leverbaar, voorraad mag tot 3-10-2019 opgebruikt worden. Legurame kan eventueel vervangen worden door een uitvloeier.

Kerb Flo mag inclusief de vooropkomst aangevuld worden tot 3,75 l (maximaal 5 keer toepassen, 0,25 l per keer).

Safari maximaal 4 keer toepassen met een interval van 7 dagen (in totaal maximaal 120 gram Safari). Safari alleen inzetten op gevoelige onkruiden als bingelkruid, herik, kamille, klein kruiskruid, knopkruid en zwarte nachtschade.

Titus maximaal 2 keer toepassen met een interval van 10 dagen (in totaal maximaal 70 gram Titus).

Meng geen Safari of AZ500 met **Dual Gold** (niet op zandgrond) of **Frontier Optima**.

Bodemherbiciden in aardappelen

De meest bedrijfszekere onkruidbestrijding in aardappelen wordt nog steeds verkregen wanneer er voor opkomst op goed bezakte aardappelruggen een bodemherbicide gespoten wordt. Veel gebruikte combinaties zijn o.a.:

- **4 l Boxer + 0,5 – 0,75 l Sencor vlb. + (0,15 l Centium (zwaluwtong) of 1-1,5 l Challenge (melden))**
- **3 l Boxer + 2,5 l Proman (zacht voor het gewas, daarom ook zeer geschikt voor pootaardappelen)**
- **0,2 l Centium 360 CS + 1,5 l Challenge + (0,4 l Sencor vlb./ 1,5 l Proman) (zeer brede werking; geschikt voor milieukeur-aardappelen; i.v.m. mogelijke gewasreactie ruim voor opkomst toepassen)**

Om een juiste combinatie van middelen te maken is het belangrijk te weten welke onkruiden u kunt verwachten op het te behandelen perceel. In de tabel staan de sterke en zwakke kanten van de diverse middelen vermeld.

	Sencor	Proman	Boxer	Challenge	Centium
Duist/ straatgras	+++	++	+++	++	-
Duivekervel	+++	+	++	+++	-
Kleefkruid	-	-	+++	++	+++
P. dovenetel	+++	++(+)	++	-	+
Melden	++	++(+)	++	+++	-
Perzikkruid	+++	++	+(+)	+(+)	+(+)
Varkensgras	(+)	++	+	-	+++
Zwaluwtong	(+)	++(+)	+	++	++(+)
Nachtschade	-	+(+)	++(+)	-	++

+++ = zeer goed ++ = goed + = matig - = onvoldoende

Korte TIPs

- Wanneer het vlagblad uit is in wintergerst is het tijd voor de T2 ziektebestrijding met bv **0,75 – 1 l Aviator Xpro + 0,7 l Alternil**. Voor het verschijnen van de kafnaalden kan men met **1 l Yatze** een extra groeiregulatie geven.