

Eerste perzik- en sjalottenluizen in suikerbieten gevonden

De druk van bladluizen neemt toe, controleer uw gewas daarom enkele keren per week op de aanwezigheid ervan. Wanneer er meer dan 2 groene perzik- en sjalottenluizen per 10 planten gevonden worden is het advies een bestrijding uit te voeren. Gebruik hiervoor **0,15 - 0,25 l Calypso/ Bariard, 0,4 kg Pirimor of 140 gram Tepeki**.

Wanneer er veel planten (30 - 50%) aanwezig zijn met kolonievorming van zwarte bonenluis, heeft het gebruik van Pirimor (max. 2 keer) de voorkeur. Calypso en Bariard (beiden max. 2 keer) hebben als voordeel dat ze nevenwerking hebben op vliegende bietenkevertjes die momenteel op verschillende percelen de hartblaadjes aanvreten. Zet Tepeki pas in vanaf het 6 bladstadium, het middel heeft dan een nawerking van ca. 3 weken.

Spuit bij voorkeur 's avonds wanneer sprake is van een hoge RV en gebruik liefst 500 liter water per hectare.

Er zijn momenteel al heel veel natuurlijke vijanden in de suikerbieten actief, om deze te sparen adviseren wij om alleen in uiterste noodzaak een synthetische pyrethroïde in te zetten (> 8 eitjes van de bietenvlieg per plant met 4 bladeren).

Aanvulling bodemherbiciden in suikerbieten

Vanaf het twebladstadium van de suikerbieten kan ter versterking van de LDS-bespuiting en om nakiemers te voorkomen, gestart worden met het regelmatig toedienen van **Frontier Optima (bv 0,2 - 0,3 - 0,4 l)** of **Dual Gold (bv 0,25 - 0,5 - 0,75 l)**. Op percelen waar veel meldensoorten verwacht worden is het aan te raden bij de laatste onkruidbestrijding **2 l Goltix SC/ Bettix SC** te gebruiken voor extra nawerking (maximaal 5 liter per product per teelt). Het onkruid is op de meeste percelen onder controle. Bodemherbiciden als Centium trekken na de laatste neerslag heel hard aan onkruid en gewas. Blijf de bieten regelmatig controleren op onkruid, vooral melden kunnen verrassen.

Onkruidbestrijding in aardappelen na opkomst

Het is zaak om onkruid dat aan de bodemherbiciden is ontsnapt zo snel mogelijk aan te pakken. Afhankelijk van het ras en de te bestrijden onkruiden zijn er verschillende mogelijkheden om kiemend onkruid te bestrijden.

De doseringen zijn afhankelijk van het ras, de ontwikkeling van de aardappelen en de weersomstandigheden. Spuit altijd op een afgehard gewas en doe dit bij voorkeur 's avonds.

In Sencor tolerante rassen kan dit o.a. met **100 – 150 ml Sencor + (Basagran) + uitvloeier** of **100 ml Sencor vlb + 20-40 gram Titus + uitvloeier**, in rassen die geen Sencor verdragen **0,2 l Basagran + 20-40 gram Titus + uitvloeier**.

In alle rassen tegen diverse zaadonkruiden en o.a. melkdistel, haagwinde of opslag van witlof/ cichorei:

40 gram Titus + 0,25 l Webowet, na 10-14 dagen herhalen met **30 gram Titus + 0,25 l Webowet**.

Spuit Titus alleen wanneer de temp. <23°C en wanneer er sprake is van een hoge RV!

Meer knollen met Powerleaf Fosfaat in aardappelen

Een aardappelplant onttrekt veel fosfaat rond het moment dat de plant bezig is met wortelontwikkeling, loofgroei en aanleg van de knollen. Gemiddeld wordt er 1 – 1,5 kg fosfaat per dag per hectare opgenomen gedurende 10 – 14 dagen. Hierdoor kan er bij bepaalde omstandigheden een (tijdelijk) tekort ontstaan. Denk aan droogte, snelle groei, hoge en lage temperaturen. Fosfaat bladbemesting is een oplossing om de plant te voorzien van voldoende fosfaat.

Powerleaf Fosfaat is gemakkelijk te mengen met de phytophthora-bestrijding en werkt zeer snel. De toepassing van deze bladmeststof is in het haakjesstadium van de aardappelplant het meest effectief. Met 5 liter per hectare wordt er 2,2 kg fosfaat gegeven die voor bijna 100% in de plant komt. Afgelopen jaren heeft Powerleaf Fosfaat zowel in proeven als in de praktijk tot wel 15% meer knollen per hectare gegeven. Ons advies is **2 x 5 liter Powerleaf Fosfaat** in het haakjesstadium (2^e en 3^e phytophthora-bespuiting).

Wees alert op trips in uien

In winteruien en 2^e jaars plantuien worden alweer tripsen aangetroffen, of het dezelfde kant als vorig jaar op zal gaan is o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. Wat we vorig jaar geleerd hebben dat we vroeg van start moeten gaan met de bestrijding wanneer de tripsen nog in het larvenstadium zijn. Om ook natuurlijke vijanden de strijd tegen tripsen aan te laten gaan, is het advies het gebruik van synthetische pyrethroiden te beperken.

Start bij het aantreffen van de eerste tripslarven in het gewas met **0,5 l Movento** of **0,75 l Batavia + 2 l Robbester**.

Uitnodiging proefveld met licentieverlenging “veiligheid en techniek”

Donderdagmiddag 13 juni bent u van harte welkom voor een bezoek aan ons proefveld. Wij praten u bij over diverse zaken en bieden de mogelijkheid tot verlenging van de spuitlicentie in de categorie veiligheid en techniek. Meld u vooraf aan wanneer u uw licentie wil verlengen of wil blijven BBQ' en. [AANMELDEN PROEFVELD](#)
Kijk voor meer informatie over het proefveld op onze [website](#).

Korte TIPs

- Wanneer bij 50% van de aardappelen de blaadjes uitgevouwen zijn, is het advies om van start te gaan met de ziektebestrijding. Een sterk middel om mee van start te gaan is **0,6 l Revus**.

Theunisse BV | Postbus 10 | 4650AA Steenbergse | T 0167-565550 | E info@theunissebv.nl | KvK 20034807

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.