

Afbranden van zaaiuien voor opkomst

Vergeet niet om zaaiuien kort voor opkomst af te branden. Tot enkele dagen voor opkomst kan dit met **2 l Glyfosaat** (bestrijdt ook grassen) of tot 10% opkomst met o.a. **1,5 l Dragoon** (Diquat).

Vul rond de opkomst de totale dosering **Stomp** aan tot **1,5 – 1,75 l/ha**. Dit kan tegelijkertijd met het afbranden gebeuren. Omdat Stomp de werking van diquat versterkt, deze niet mengen wanneer er al uien boven staan.

Vooral om kieming van klein kruiskruid te voorkomen, adviseren wij vanaf de opkomst t/m het kramstadium éénmalig **0,2 l AZ 500** te spuiten. Stel deze bespuiting ook onder droge omstandigheden niet uit. AZ500 is altijd veilig voor uien.

Tijd voor de T1 ziektebestrijding komt eraan

De ontwikkeling van de wintertarwe loopt duidelijk voor op vorig jaar. Hoewel we in alle percelen wel septoria aantreffen, valt de ziektedruk over het algemeen mee. We moeten wel alert blijven op gele roest, vooral in gevoelige rassen als Benchmark en Reform vinden we incidenteel aangetaste blaadjes.

Wanneer de 2^e knoop verschenen is (gewaslengte is dan ca. 25 – 30 cm), is het tijd voor de T1 ziektebestrijding. Aanwezigheid van gele roest kan een reden zijn om de T1 bespuiting naar voren te halen.

Voor T1 is ons advies **1 l Adexar** of op minder ziektegevoelige rassen **1 l Opus Team** (stro behandeld met Opus Team mag niet vervoerd worden!).

Ook dient de 2^e groeiregulatie uiterlijk bij het verschijnen van de 2^e knoop uitgevoerd te worden.

Ons advies voor de meeste rassen is:

0,5 l CeCeCe + 0,3 kg Prodax of **0,5 l CeCeCe + 0,2 – 0,25 l Moddus** (of **0,5 l CeCeCe + 0,15 l Moddus EVO**).

Op minder legeringsgevoelige rassen kan evt. volstaan worden met **0,5 – 1 l CeCeCe**.

In de praktijk wordt de T1 ziektebestrijding en de 2^e groeiregulatie vaak gecombineerd uitgevoerd. Om de periode tussen T1 en T2 (vlagblad uit) niet te groot te laten worden, kan het bij gezonde gewassen beter zijn om de T1 bespuiting wat uit te stellen tot de 3^e week april en de 2^e groeiregulatie apart en eerder uit te voeren.

Onkruidbestrijding in zomergranen

Wanneer de meeste onkruiden gekiemd zijn, kan aanwezig onkruid in de zomergranen bestreden worden.

In zomertarwe (o.a. ook tegen windhalm, jonge duist, paarse dovenetel en ereprijs):

- **130 gram Capri Twin + 1 l MCPA + 0,3 – 0,45 l Starane Top + 1 l Robbester**

*) Voor de gelijktijdige bestrijding van aardappelopslag de hoogste dosering Starane Top aanhouden.

In alle zomer- en wintergranen (uiterlijk tot in het vlagbladstadium!):

- **1 l Tapir + 1,5 – 2 l MCPA** (geeft tevens een goede bestrijding van distels, hofblad en cichoreiopslag).

Bij aanwezigheid van ereprijs of grotere dovenetels kan **70 gram Biathlon 4D** of **1,5 l Fox 480EC** toegevoegd worden. Meng nooit Fox 480EC met olie of uitvloeier, dit veroorzaakt verbranding!

Speciaal voor aardappelopslag aan **1 l Tapir, 0,3 - 0,45 l Starane Top** toevoegen.

Grotere duist en windhalm kunnen in alle granen bestreden worden met **0,8 – 1,2 l Puma Extra EW + 1 l olie**.

Groeiregulatie van zomergranen

In zomertarwe wordt met een éénmalige inzet van **1 l CeCeCe** aan het einde van de uitstoeling meestal voldoende halmversteving verkregen om legering te voorkomen. De beste versteving geeft een éénmalige behandeling einde uitstoeling – begin schieten met **0,3 – 0,5 kg Prodax**.

In zomergerst is het advies om voor de halmversteving tussen einde uitstoeling en het verschijnen van de tweede knoop **0,6 l Moddus (EVO)** te spuiten. Een gesplitste toepassing echter van **2 x 0,3 l Moddus EVO** geeft de beste versteving.

Let op: Moddus EVO is de opvolger van Moddus 250 EC, alleen Moddus EVO mag 2 keer toegepast worden.

Korte TIPS

- Wederom is er een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het product Asulam in o.a. spinazie. De vrijstelling in spinazie geldt voor een dosering van **6 l Agrichem Asulam 2** voor opkomst. Voor de zaadteelt van spinazie geldt deze vrijstelling van 15 maart tot 10 juli 2019, voor de productieteelt is dit voor de periode van 26 april tot 24 augustus 2019. Uitsluitend toe te passen met een techniek uit tenminste de klasse DRT95.
- Contoleer suikerbieten vanaf opkomst op aanwezigheid van insectenvraat van o.a. aardvlooien, trips en bietenkevertjes. Voer bij een zware aantasting zo nodig een bestrijding uit met een pyrethroïde.