

Ziektebestrijding in suikerbieten

Controleer de suikerbieten wekelijks op aantasting van schimmelziekten. Percelen waar al een bestrijding heeft plaats gevonden moeten 2-3 weken na de laatste bespuiting weer wekelijks gecontroleerd worden op nieuwe aantastingen.

Middel	groep	dosering	toepassingen	v.t.	stemphylium
Retengo Plust	triazool/strobilurine	1 l	1	4 weken	++
Opus Team	triazool	1 l	2	46 dagen	-
Spyrale	triazool	1 l	2	4 weken	+
Sphere + uitvl.	triazool/strobilurine	0,35 l	2	3 weken	+

- Er mag maximaal 2 keer per seizoen of maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine ingezet worden.
- Kies steeds een ander middel om resistentie te voorkomen. De werkingsduur van alle middelen is ca. 3 weken.

Wortelonkruiden bestrijden in stoppeland en grasgroenbemester

De druk van wortelonkruiden neemt de laatste jaren zichtbaar toe. Laat daarom geen mogelijkheid onbenut om hiertegen een bestrijding uit te voeren. Geef dit prioriteit boven het zaaien van een groenbemester!

Neem voor een goed resultaat de volgende zaken in acht:

- Laat het stoppeland enkele weken onbewerkt liggen zodat de wortelonkruiden goed kunnen ontwikkelen. Dit duurt meestal zo'n 4 weken.
- Spuit bij groeizaam weer, in een periode met een hoge luchtvochtigheid. Bij te warm weer (> 25°C), nooit in volle zon behandelen. Spuit evenmin als onweer of neerslag verwacht wordt.
- Wacht tot minimaal twee weken na de bespuiting met het uitvoeren van een grondbewerking.

Onkruid	Stoppeland	Grasgroenbemester**
Distels, veenwortel, klein hoefblad, haagwinde, aardappelopslag, smeerwortel en akkermunt	6 l Glyfosaat/ 4,5 l Roundup Ultimate+ 2 l 2,4-D*	2 l 2,4-D (niet na 1 sept.) Niet tegen veenwortel, kweekgras en aardappelopslag
Veenwortel	6 l Glyfosaat/ 4,5 l Roundup Ultimate	99 ml Primus
Akkermunt	3,6 l MCPA + 2 l 2,4-D	2 l 2,4-D (niet na 1 sept.)
Haagwinde	2 l 2,4-D	99 ml Primus of 1 l Primstar
Heermoes en smeerwortel	3,6 l MCPA + 2 l 2,4-D	
Moerasandoorn en klein hoefblad	2 l 2,4-D	2 l 2,4-D (niet na 1 sept.)
Aardappelopslag	4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate	4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate
Kweek	4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate	4 l Glyfosaat/ 3 l Roundup Ultimate

*) Om klontering te voorkomen bij deze combinatie de tank eerst vullen met water (gebruik minimaal 250 l/ha) en Glyfosaat/ Roundup Ultimate, als laatste 2,4-D toevoegen. Deze combinatie liefst binnen 1/2 uur verspuiten!

**) In een grasgroenbemester die als Ecologisch Aandachtsgebied is ingezaaid is het vanaf 8 weken na zaai (niet voor 15 juli) toegestaan een chemische onkruidbestrijding uit te voeren.

Ziektebestrijding in cichorei

Zeker voor de late leveringen is een bestrijding van bladschimmels (o.a. meeldauw) in cichorei interessant gebleken. Zet, liefst vóór het verschijnen van de 1^e ziektesymptomen **0,25 kg Flint** in. De behandeling na 2-3 weken herhalen. Flint mag maximaal 3x ingezet worden, de veiligheidsstermijn bedraagt 21 dagen.

Tegen magnesiumgebrek kan aan deze bespuiting bv **5 – 10 kg Epso Microtop** toegevoegd worden.

Aandacht voor middelen met een aflever- en opgebruikstermijn

Hieronder een overzicht van de aflever- en opgebruikstermijn van enkele belangrijke middelen waarvan de toelating beëindigd. Reserveer uw bestelling tijdig voor het verstrijken van de aflevertermijn, OP=OP!

Middel	Aflevertermijn	Opgebruikstermijn
Basta/Finale	—	31 jan '20
Difure Pro	—	19 mrt '20
Pyramin DF	—	30 jun '20
Opus Team	31 okt '19	31 okt '20
Reglone e.a.	4 nov '19	4 nov '19
Betanal Maxxpro	31 jan '20	1 juli '20